



RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS REMUME

GUIA DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO AO USUÁRIO

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	6
2. CLASSE TERAPÊUTICA/ GRUPO FARMACOLÓGICO – MEDICAÇÕES DISPENSADAS NAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	7
2.1 AGENTES ANTIGOTA	7
2.2 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS	8
2.3 ANESTÉSICOS E ADJUVANTES	9
2.4 ANSIOLÍTICOS	10
2.5 ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS	11
2.6 ANTI-HISTAMÍNICOS	12
2.7 ANTIANÊMICOS	13
2.8 ANTIANGINOSOS E VASODILATADORES	14
2.9 ANTIARRÍTMICOS	15
2.10 ANTIASMÁTICOS	16
2.11 ANTIBACTERIANOS	18
2.12 ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS	23
2.13 ANTICOLINÉRGICOS	24
2.14 ANTICONVULSIVANTES	25
2.15 ANTIDEPRESSIVOS	26
2.16 ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS	27
2.17 ANTIESPASMÓDICOS	28
2.18 ANTIFÚNGICOS	29
2.19 ANTI-HIPERTENSIVOS	31
2.20 ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES	34
2.21 ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES	36
2.22 ANTIPARASITÁRIOS	38
2.23 ANTIPARKINSONIANOS	39
2.24 ANTISSECRETORES	40
2.25 ANTIVIRAIS	41
2.26 ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS	42
2.27 HIPOLIPEMIANTES	43
2.28 HORMÔNIOS SEXUAIS	44

2.29 HORMÔNIOS TIREOIDIANOS	45
2.30 INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS	46
2.31 LAXATIVOS	48
2.32 MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	49
2.33 MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CHOQUE	50
2.34 MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE	51
2.35 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA OCULAR	52
2.36 PREPARAÇÕES NASAIS	53
2.37 SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO	54
2.38 SOLVENTES E AGENTES DILUENTES	55
2.39 SUBSTÂNCIAS MINERAIS	56
2.40 VITAMINAS	57
2.41 TRATAMENTO DE FERIDAS	58
3.0 CLASSE TERAPÊUTICA/ GRUPO FARMACOLÓGICO – MEDICAÇÕES DISPENSADAS EXCLUSIVAMENTE NA FARMÁCIA CENTRAL	59
3.1 ANALGÉSICO-OPIÓIDE	59
3.2 ANSIOLÍTICOS	60
3.3 ANTICONVULSIVANTE	61
3.4 ANTIDEPRESSIVOS	62
3.5 ANTIFÚNGICO	63
3.6 ANTIPARKISONIANO	64
3.7 ANTIPSICÓTICO	65
4.0 CLASSE TERAPÊUTICA/ GRUPO FARMACOLÓGICO – MEDICAÇÕES DISPENSADAS NAS REGIONAL LESTE – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	66
4.1 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS	66
4.2 ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS	67
4.3 ANTI-HISTAMÍNICOS	68
4.4 ANTIASMÁTICOS	69
4.5 ANTIBACTERIANOS	70
4.6 ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS	74
4.7 ANTIESPASMÓDICOS	75
4.8 ANTIFÚNGICOS	76
4.9 ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES	77
4.10 ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES	78
4.11 ANTIPARASITÁRIOS	79

4.12 ANTIVIRAIS	80
4.13 SUBSTÂNCIAS MINERAIS	81
5. CLASSE TERAPÊUTICA/ GRUPO FARMACOLÓGICO – MEDICAÇÕES DISPENSADAS EXCLUSIVAMENTE NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	82
5.1 HORMÔNIOS SEXUAIS	82
5.2 ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES	84
5.3 ANTIBACTERIANOS	86
5.4 ANTIFÚNGICOS	90
5.5 ANTIVIRAIS	93
5.6 ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS	94
5.7 ANTIANÊMICOS	95
5.8 ANTIESPASMÓDICOS	96
5.9 ANTIEMÉTICOS	97
5.10 ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES	98
5.11 ANTIFISÉTICO	99
5.12 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS	100
5.13 ANTIDEPRESSIVOS	101
5.14 ANTI-HIPERTENSIVOS	102
5.15 ANTISSECRETORES	103
5.16 VITAMINAS	104
5.17 ANTICOAGULANTE	105
6. CLASSE TERAPÊUTICA/ GRUPO FARMACOLÓGICO – MEDICAÇÕES DISPENSADAS EXCLUSIVAMENTE NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	106
As medicações dispensadas no Departamento de Saúde da Criança e Adolescente são para pacientes que passaram por consultas no departamento.	106
6.1 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS	106
6.2 ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS	107
6.3 ANTI-HISTAMÍNICOS	108
6.4 ANTIANÊMICOS	109
6.5 ANTIASMÁTICOS	110
6.6 ANTIBACTERIANOS	112
6.7 ANTICONVULSIVANTES	117
6.8 ANTIDEPRESSIVOS	119
6.9 ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS	120
6.10 ANTIFÚNGICOS	121
6.11 ANTI-HIPERTENSIVOS	123

6.12 ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES	125
6.13 ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES	126
6.14 ANTIPARASITÁRIOS	128
6.15 ANTISSECRETORES	129
6.16 ANTIVIRAIS	130
6.17 ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS	131
6.18 HORMÔNIOS SEXUAIS	132
6.19 HORMÔNIOS TIREOIDIANOS	133
6.20 INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS	134
6.21 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA OCULAR	135
6.22 SUBSTÂNCIAS MINERAIS	136
6.23 VITAMINAS	137
6.24 ANTIFISÉTICO	138
7. CLASSE TERAPÊUTICA/ GRUPO FARMACOLÓGICO – MEDICAÇÕES DISPENSADAS EXCLUSIVAMENTE NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) – DST- AIDS	139
7.1 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS	139
7.2 ANTI-HISTAMÍNICOS	140
7.3 ANTIANÊMICOS	141
7.4 ANTIASMÁTICOS	142
7.5 ANTIBACTERIANOS	143
7. 6 ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS	147
7.7 ANTIFÚNGICOS	148
7.8 ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES	150
7.9 ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES	151
7.10 ANTIPARASITÁRIOS	152
7.11 ANTISSECRETORES	153
7.12 ANTIVIRAIS	154
7.13 SUBSTÂNCIAS MINERAIS	155
7.14 VITAMINAS	156
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	157

1. APRESENTAÇÃO

A Remume (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) é uma lista de medicamentos adquiridos pelo município, norteadas pela RENAME, para atender as necessidades de saúde prioritárias da população. O Sistema Municipal de Assistência Farmacêutica, que engloba ações desde a seleção de medicamentos até a utilização pelo usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) no município, serve como base para orientar a aquisição de produtos eficazes e seguros.

A Remume tem a finalidade de ampliar o acesso aos medicamentos, considerados essenciais para usuários de Juiz de Fora, de forma a alcançar um número de usuários que necessitam de tratamento, orientando a organização de todas as etapas da Assistência Farmacêutica (AF), especialmente as prescrições médicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

São considerados medicamentos essenciais, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aqueles que satisfazem as necessidades de saúde prioritárias da população, os quais devem ser selecionados por critérios de eficácia, segurança, conveniência, qualidade e custo favorável. Eles devem estar acessíveis em todos os momentos, na dose apropriada, a todos os segmentos da sociedade.

2. CLASSE TERAPÊUTICA/ GRUPO FARMACOLÓGICO – MEDICAÇÕES DISPENSADAS NAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE

2.1 AGENTES ANTIGOTA

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALOPURINOL 100 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	AGENTES ANTIGOTA
2	ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	AGENTES ANTIGOTA

ALOPURINOL

Utilizado na prevenção de crises de gota.

Indicação: redução de valores anormais de excesso de ácido úrico.

2.2 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DIPIRONA SÓDICA 500 MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
2	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	USO INTERNO DAS UBS.	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
3	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 10 ML.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
4	PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 15 ML.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
5	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

DIPIRONA SÓDICA

Indicação: age minimizando febre e dores.

PARACETAMOL

Indicação: age minimizando febre e dores.

2.3 ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% SEM VASO CONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO COM 5ML	USO INTERNO DAS UBS.	ANESTÉSICOS LOCAIS
2	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL, BISNAGA	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANESTÉSICOS LOCAIS

LIDOCAÍNA, CLORIDRATO

Medicamento também conhecido como anestésico local, age bloqueando o início e a condução do impulso nervoso.

2.4 ANSIOLÍTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DIAZEPAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	USO INTERNO DAS UBS.	ANSIOLÍTICOS
2	DIAZEPAM 10 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANSIOLÍTICOS

DIAZEPAM

Indicação: Atua no controle da ansiedade, em crises convulsivas, no estado epiléptico, e também é usado como sedativo no pré-operatório, em exames(endoscopia) e outros procedimentos médicos em que a anestesia geral é dispensável. Ademais, o diazepam pode ser indicado no tratamento da insônia e ansiedade.

2.5 ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO

É um analgésico anti-inflamatório não esteroidal (AINE).

Indicação: febre; dor. Porém, seu uso clínico está mais relacionado a sua ação cardiovascular, uma vez que é capaz de diminuir a agregação plaquetária.

2.6 ANTI-HISTAMÍNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTI-HISTAMÍNICOS
2	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTI-HISTAMÍNICOS
3	LORATADINA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTI-HISTAMÍNICOS
4	LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTI-HISTAMÍNICOS
5	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTI-HISTAMÍNICOS
6	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,	USO INTERNO DAS UBS.	ANTI-HISTAMÍNICOS

DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO

Trata-se de um anti-histamínico.

Indicação: para alergia, urticária, dermatite e rinite alérgica.

LORATADINA

Trata-se de um anti-histamínico.

Indicação: alívio de sintomas gerados na rinite alérgica e na urticária idiopática crônica.

PROMETAZINA, CLORIDRATO

Trata-se de um anti-histamínico.

Anti-histamínico com forte ação sedativa, além de ser antiemético e antivertiginoso.

Indicação: usado no controle de náuseas e emese, também pode ter uso na indução do sono, porém com menor eficiência. Ademais é indicada na conjuntivite alérgica, prurido (coceira), urticária, reação anafilática e dor pós cirúrgica em associação a analgésico.

2.7 ANTIANÊMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIANÊMICOS
2	SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG FERRO/ML), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIANÊMICOS
3	SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR, COMPRIMIDO REVESTIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIANÊMICOS

ÁCIDO FÓLICO

Indicação: para prevenção e tratamento de carência de ácido fólico. Uso em anemias hemolíticas e megaloblástica.

SULFATO FERROSO

Antianêmico que atua na reposição de ferro, auxiliando na prevenção e tratamento de anemias por deficiência de ferro.

Indicação: em anemias ferroprivas da gravidez e da lactação; anemias consequentes de hemorragias agudas .

2.8 ANTIANGINOSOS E VASODILATADORES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL.	USO INTERNO DAS UBS.	ANTIANGINOSOS / VASODILATADORES
2	ISOSSORBIDA, DINITRATO 10 MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIANGINOSOS / VASODILATADORES
3	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIANGINOSOS / VASODILATADORES
4	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIANGINOSOS / VASODILATADORES

ISOSSORBIDA, DINITRATO

Trata-se de um antianginoso, vasodilatador(nitrato).

Indicação: empregado na insuficiência cardíaca congestiva, crises agudas e crônicas, além das associadas ao infarto do miocárdio.

ISOSSORBIDA, MONONITRATO

Indicação: prevenção (angina estável) e tratamento prolongado da angina do peito devido à doença arterial coronariana.

2.9 ANTIARRÍTMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIARRÍTMICOS
2	METOPROLOL, SUCCINATO, 50 MG – COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIARRÍTMICOS
3	VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIARRÍTMICOS

AMIODARONA, CLORIDRATO

A amiodarona é um antiarrítmico da classe III, extremamente eficaz no controle de arritmias.

Indicação: no tratamento e prevenção de arritmia ventricular e na taquicardia ligada à síndrome de Wolff-Parkinson-White.

METOPROLOL, SUCCINATO

Fármaco da classe II, antagonista dos receptores β -adrenérgicos, age diminuindo o esforço do coração. Trata-se de um anti-hipertensivo; antianginoso; profilático em enxaquecas (cefaléia vascular).

Indicação: uso no tratamento de angina do peito crônica (angina de esforço, na hipertensão arterial, no infarto do miocárdio; e profilaxia da enxaqueca.

VERAPAMIL, CLORIDRATO

É um fármaco antianginoso, antiarrítmico, anti-hipertensivo .

Indicação: tratamento de isquemia (falta de oxigenação para o músculo cardíaco), acompanhadas ou não de anginas mediante a esforço ou até em repouso. Utilizada também em casos de hipertensão arterial e, ainda, na prevenção de arritmias cardíacas, onde os batimentos se apresentam acelerados.

2.10 ANTIASMÁTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMINOFILINA 100MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	BRONCODILADORES
2	AMINOFILINA 24MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10ML	USO INTERNO DAS UBS.	BRONCODILADORES
3	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG/JATO, AEROSOL ORAL, FRASCO, 200 DOSES	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	CORTICOSTERÓIDES
4	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/JATO, AEROSOL ORAL, FRASCO 200 DOSES.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	CORTICOSTERÓIDES
5	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/JATO, SPRAY NASAL, FRASCO 200 DOSES.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	CORTICOSTERÓIDES
6	FENOTEROL 5 MG/ML, SOLUÇÃO, FRASCO GOTEJADOR	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIARRÍTMICOS
7	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTICOLINÉRGICOS
8	SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (XAROPE) - FRASCO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	BRONCODILADORES
9	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/JATO, AEROSOL, FRASCO 200 DOSES.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	BRONCODILADORES

AMINOFILINA

A aminofilina é um broncodilatador, antiasmático.

Indicação: tratamento de doenças caracterizadas por broncoespasmo, principalmente a asma brônquica ou o broncoespasmo associado com bronquite crônica e enfisema.

BECLOMETASONA, DIPROPIONATO

É um corticosteróide capaz de atuar como anti- inflamatório no trato respiratório e antiasmático.

Indicação: em casos de asma brônquica, no tratamento e prevenção; na rinite alérgica; espasmo brônquico; sinusites; rinite vasomotora; em doenças inflamatórias que afetam os seios nasais e paranasais e a faringe, e também, para prevenir formações carnosas da membrana mucosa nasal que podem reaparecer após retirada cirúrgica.



FENOTEROL, BROMIDRATO

É um broncodilatador que ao estimular os receptores beta adrenérgicos, no pulmão, fazem com que o músculo liso dos brônquios relaxem.

Indicação: em broncoespasmos associados a asma, tanto em crises agudas e brônquicas, quanto na prevenção de asma ocasionadas por atividades físicas. Também, trata e previne broncoespasmos causados por bronquite crônica, enfisema pulmonar e doença pulmonar obstrutiva crônica.

BROMETO DE IPRATRÓPIO

Sua ação ocorre no pulmão, na musculatura lisa dos brônquios ao antagonizar a acetilcolina e dilatar os brônquios.

Indicação: para tratar broncoespasmo relacionado a bronquite crônica, enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, além da asma, em ação conjunta com outros broncodilatadores.

SALBUTAMOL, SULFATO

É um broncodilatador com baixa durabilidade em quadros de obstrução reversível das vias aéreas, na asma, bronquite crônica e enfisema. Não sendo a principal escolha para tratar casos graves e pouco estáveis. Tem a capacidade de relaxar o músculo liso dos brônquios levando a uma broncodilatação ao causar estímulo nos receptores beta 2 nos pulmões.

Indicação: prevenir e tratar broncoespasmo em caso de bronquite crônica; enfisema pulmonar; doença pulmonar obstrutiva crônica e em casos de broncoespasmo relacionado a esforço físico, atuar na prevenção.

2.11 ANTIBACTERIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	PENICILINAS
2	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	PENICILINAS
3	AMOXICILINA 50MG/ML (250MG/5ML), PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60ML, COM DOSADOR GRADUADO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	PENICILINAS
4	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5G/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 75ML	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	PENICILINAS
5	AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG POR FRASCO), PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	MACROLÍDEOS
6	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	MACROLÍDEOS
7	CEFALEXINA 500MG, COMPRIMIDO OU CÁPSULA EM BLISTER	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	CEFALOSPORINAS
8	CEFALEXINA 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 100ML	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	CEFALOSPORINAS
9	CIPROFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	QUINOLONAS
10	CLARITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	MACROLÍDEOS
11	DOXICICLINA 100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	TETRACICLINAS
12	METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIBACTERIANOS/ ANTIPROTOZOÁRIO
13	METRONIDAZOL 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIBACTERIANOS/ ANTIPROTOZOÁRIO
14	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G, POMADA, BISNAGA COM 10G.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIBACTERIANOS DE USO USO TÓPICO

15	NITROFURANTOÍNA 100 MG, CÁPSULA GELATINOSA.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	OUTROS ANTIBACTERIANOS
16	SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1%, CREME,	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIBACTERIANOS DE USO TÓPICO
17	SULFAMETAXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	OUTROS ANTIBACTERIANOS
18	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETROPINA 8MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 50ML	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	OUTROS ANTIBACTERIANOS
19	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO CONTA GOTAS COM 5ML	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	OUTROS ANTIBACTERIANOS

AMOXICILINA

É uma penicilina usada como antibacteriano que atende uma grande variedade de espécies gram-positivas e gram-negativas.

Indicação: é utilizado na prevenção da endocardite bacteriana; tratamento da amigdalite; otite média; sinusite; gonorreia; infecção urinária, odontogênica, da pele e no trato respiratório baixo. Também é indicado nas infecções por *Chlamydia* em grávidas, na doença de Lyme, gastrite por *Helicobacter pylori*; úlcera péptica por *Helicobacter pylori*.

AMOXICILINA, ÁCIDO CLAVULÂNICO

Trata-se de uma penicilina que atende um grande variedade de espécies gram-positivas e gram-negativas. A amoxicilina também é encontrada em associação ao ácido clavulânico, que é produzido por meio da fermentação do *Streptomyces clavuligerus*, sendo um inibidor de betalactamases, melhorando a eficácia da amoxicilina.

Indicação: em infecções urinárias, odontogênicas, de pele, ainda para amigdalite, sinusite e vaginite.

AZITROMICINA, DI-HIDRATADA

Antibacteriano pertencente à família dos macrolídeos.

Indicação: em casos de infecção do trato respiratório inferior, bronquite e pneumonia; em casos de infecção do trato respiratório superior, sinusite e faringite/tonsilite. No tratamento de infecções genitais não complicadas devido a *Chlamydia trachomatis* e a *Neisseria gonorrhoeae* (ausência de

resistência múltipla). Indicado no tratamento de cancro em *Haemophilus ducreyi*.

CEFALEXINA, MONOHIDRATADA

Faz parte dos betalactâmicos, sendo uma cefalosporina de primeira geração. Tem a capacidade de impedir a síntese da parede celular bacteriana, agindo em um amplo espectro contra Gram positiva e Gram negativa, além de ter rápida absorção.

Indicação: em infecções trato geniturinário; óssea; de pele e tecido mole; orofacial por anaeróbicos e por cocos Gram-positivos; pneumonia; otite média; faringite; amigdalite.

CLARITROMICINA

Trata-se de um antibacteriano, da família dos macrolídeos.

Indicação: na faringite; amigdalite; pneumonia; sinusite; na infecção orofacial causada por anaeróbicos ou por cocos Gram positivos; em infecções das vias aéreas superiores e inferiores, além de infecções da pele e tecidos moles, ocasionados por microrganismos sensíveis à claritromicina. Também é indicada no tratamento de infecções provocadas por *Mycobacterium avium* ou *Mycobacterium intracellulare* (disseminadas ou localizadas) e *Mycobacterium chelonae*, *Mycobacterium fortuitum* ou *Mycobacterium kansasii* (localizadas).

CLORIDRATO DE DOXICICLINA

Antibacteriano, pertence ao grupo das tetraciclina.

Indicação: indicado para o tratamento de diversas infecções, ocasionadas por agentes sensíveis à doxiciclina. Tratamento da cólera, gengivite ulcerativa aguda com necrose (infecção de Vincent); periodontite (*Actinobacillus actinomycetemcomitans*); prevenção e tratamento da malária; tratamento da febre maculosa. Uso em casos que a penicilina é contra- indicada. Auxilia no tratamento da infecção aguda por amebas no intestino e no tratamento da acne.

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO

É um agente antibacteriano fluoroquinolônico sintético.

Indicação: tratamento de infecções complicadas e não complicadas ocasionadas por microrganismos sensíveis ao ciprofloxacino. - Infecções do trato genito-urinário. Trato respiratório: o cloridrato de ciprofloxacino Possível tratamento de escolha, no trato respiratório, em caso de

pneumonias causadas por *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Proteus spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella catarrhalis*, *Legionella spp.* e *Staphylococcus*. Não deve ser considerado como primeira escolha em casos de pacientes ambulatoriais com pneumonia causada por *Pneumococcus*. Recomendado para tratamento da otite média e sinusite, principalmente se a infecção for causada por organismos gram-negativos, inclusive *Pseudomonas aeruginosa* ou *Staphylococcus*.

METRONIDAZOL

É um antimicrobiano e antiprotozoário. Possui boa atuação em várias doenças protozoárias e infecções bacterianas ao causar morte celular dessas, agindo sobre o DNA. Alcança sua absorção máxima entre 8 e 12 horas, com meia vida plasmática de aproximadamente 8 a 10 horas. O consumo de bebida alcoólica e metronidazol não é recomendado.

Indicação: em infecção oral causada por microrganismos anaeróbicos, tais como *Bacteroides*, *Clostridium spp* e alguns estreptococos; periodontite por *Actinobacillus actinomycetemcomitans*; tricomoníase; vaginite por *Gardnerella vaginalis*.

NEOMICINA + BACITRACINA

O sulfato de neomicina + bacitracina zínica é um medicamento formado pela associação de dois antibióticos de uso local, sem administração por via sistêmica.

Indicação: tratamento de infecções bacterianas da pele e de mucosas, causadas por microorganismos sensíveis: piodermites, impetigo, eczemas infectados, otite externa, infecções da mucosa nasal, furúnculos, antraz, ectima, abscessos, acne infectada, intertrigo, úlceras cutâneas e queimaduras infectadas. Na profilaxia de infecções cutâneo-mucosas provenientes de ferimentos cortantes (inclusive cirúrgicos), abrasões, queimaduras pouco extensas, dentre outros.

NITROFURANTOÍNA

É um agente antibacteriano, com atividade em diversos microrganismos Gram positivos e Gram negativos. É capaz de causar danos ao DNA bacteriano, modificando ou inativando suas proteínas. Sua absorção é feita rapidamente na forma microcristalina, porém demonstra uma menor irritação gastrointestinal na sua forma macrocristalina.

Indicação: limita-se ao tratamento de infecções do trato urinário.

SULFADIAZINA DE PRATA

Tem ação bactericida, sendo capaz de atuar na parede celular bacteriana, também demonstra eficiência contra fungos. Sua aplicação é feita de forma tópica, tratando, por exemplo, queimaduras infectadas.

Indicação: em feridas infectadas.

SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA

Indicação: em casos de infecção gênito-urinária, renal, respiratória, bronquite crônica, na otite média, em alguns casos de pneumonia. Além de uso na toxoplasmose.

TOBRAMICINA

Antibacteriano, pertencente a classe dos aminoglicosídeos. Estudos realizados in vitro, indicaram que a tobramicina é ativa contra cepas sensíveis dos seguintes microrganismos: Staphylococci, inclusive *S. aureus* e *S. epidermidis* (coagulase positivos e coagulase negativos), incluindo cepas resistentes à penicilina. Streptococci, além de algumas espécies do grupo A beta-hemolítico, algumas espécies não hemolíticas e algumas cepas de *Streptococcus pneumoniae*. *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter aerogenes*, *Proteus mirabilis*, *Morganella morganii*, maioria das cepas de *Proteus vulgaris*, *Haemophilus influenzae* e *H. aegyptius*, *Moraxella lacunata*, *Acinetobacter calcoaceticus* e algumas espécies de *Neisseria*. Os estudos de sensibilidade bacteriana indicaram que muitos microrganismos resistentes à gentamicina mantêm a sensibilidade à tobramicina.

Indicação: tratamento de infecções externas dos olhos e seus anexos, causadas por bactérias sensíveis à tobramicina.

2.12 ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	USO INTERNO DAS UBS.	ANTI-HEMORRÁGICOS
2	VARFARINA SÓDICA 5 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTICOAGULANTES

FITOMENADIONA

Indicação: tratar e/ou prevenir sangramentos, em casos de uso exagerado de anticoagulante oral, por exemplo a varfarina. Na doença hemorrágica do recém-nascido. Recomendado em situações em que os valores de vitamina apresentam-se baixos, em adultos. Hipoprotrombinemia.

VARFARINA SÓDICA

Anticoagulante oral, que deve ser administrado de forma individualizada. Seu uso necessita acompanhamento por meio de exames hematológicos para ajuste da dosagem, quando necessário. Inibe a síntese hepática de diversos fatores de coagulação, ao competir com a vitamina K. O efeito como anticoagulante é potencializado se no intestino a vitamina K tem sua produção reduzida.

Indicação: em casos de doença valvular cardíaca age prevenindo o embolismo sistêmico, também naqueles que possuem próteses da válvula cardíaca ou fibrilação atrial. Atua diminuindo o risco de acidente vascular cerebral.

2.13 ANTICOLINÉRGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML..	USO INTERNO DAS UBS.	ANTICOLINÉRGICOS

ATROPINA, SULFATO

Trata-se de um antiespasmódico, anti-arrítmico, antagonista muscarínico clássico e alcalóide da beladona. Tem a função de estimular o sistema nervoso central (SNC), possuindo uma boa absorção por via oral.

Indicação: no tratamento da bradicardia sinusal, em decorrência de infarto agudo do miocárdio; na redução de secreções como pré anestésico; na intoxicação por inibidores da colinesterase; em procedimentos oftalmológicos é indicado para se conseguir midríase e paralisia do músculo ciliar (cicloplegia), como nos exames de refração e de fundo de olho.

2.14 ANTICONVULSIVANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTICONVULSIVANTES
2	FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTICONVULSIVANTES
3	FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR, GOTEJADOR 20 ML.	USO INTERNO DAS UBS.	ANTICONVULSIVANTES

FENOBARBITAL

É um anticonvulsivante, sedativo, pertencente a classe dos barbitúricos, sendo um dos primeiros a ser desenvolvido. Tem atuação sobre a intensidade e duração das crises, caracterizado por ser um depressor do sistema nervoso central.

Indicação: epilepsia; na convulsão febril em crianças; na hiperbilirrubinemia do recém-nascido.

2.15 ANTIDEPRESSIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIDEPRESSIVOS
2	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, CÁPSULA.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIDEPRESSIVOS

AMITRIPTILINA, CLORIDRATO

É um antidepressivo tricíclico largamente indicado. Potencializa as concentrações de serotonina e norepinefrina nas sinapses no sistema nervoso central (SNC); numa análise mais prolongada apresenta aumento da resposta dada a estímulos adrenérgicos e serotoninérgicos. Sua absorção ocorre de forma rápida e eficaz. Tem ação iniciada entre a segunda e terceira semana de uso.

Indicação: depressão; bulimia; alívio da dor neuropática, em alguns casos.

FLUOXETINA, CLORIDRATO

Indicação: tratamento da depressão; distúrbio bipolar; bulimia nervosa.

2.16 ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BROMOPRIDA 10 MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIEMÉTICO
2	BROMOPRIDA 4MG/ML – SOLUÇÃO ORAL- FRASCO COM 20 ML	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIEMÉTICO
3	BROMOPRIDA 10MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL , AMPOLA COM 2 ML	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIEMÉTICO
4	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	AGENTES PROCINÉTICOS
5	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	AGENTES PROCINÉTICOS
6	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	USO INTERNO DAS UBS.	AGENTES PROCINÉTICOS

BROMOPRIDA

É um antiemético.

Indicação: distúrbios da motilidade gastrintestinal; refluxo gastroesofágico; náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de medicamentos).

METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO

Trata-se de um antiemético, capaz de aumentar a motilidade do esôfago, do estômago e do intestino, assim, sua ação agiliza o esvaziamento do estômago e estimula o trânsito intestinal.

Indicação: vômito; náusea; refluxo gastro-esofágico; vômitos provocados por uremia, radiação, distúrbios gastrointestinais, citotóxicos.

2.17 ANTIESPASMÓDICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIESPASMÓDICOS
2	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML.	USO INTERNO DAS UBS.	ANTIESPASMÓDICOS

ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO

Indicação: úlcera estomacal e duodenal; cólica.

2.18 ANTIFÚNGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CETOCONAZOL 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIFÚNGICO
2	CLOTRIMAZOL 10 MG/G (1%), CREME VAGINAL, BISNAGA COM 35 G + APLICADOR	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIFÚNGICO
3	FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIFÚNGICO
4	ITRACONAZOL 100 MG, CÁPSULA.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIFÚNGICO
5	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80 G + APLICADOR.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIFÚNGICO
6	NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIFÚNGICO

CETOCONAZOL

Indicação: tratamento de candidíase oral, vaginal, disseminada; dermatite seborréica; casos graves de - Tinea corporis; Tinea cruris; Tinea pedis (pé-de-atleta); Tinea versicolor (pitiríase versicolor).

CLOTRIMAZOL

Indicação: tratamento de dermatomicoses causadas por dermatófitos, leveduras, bolores, etc. (por ex.: *Tinea pedis*, *Tinea manuum*, *Tinea corporis*, *Tinea inguinalis*, *Pityriasis versicolor*). Tratamento de infecções dos genitais externos e áreas adjacentes na mulher, assim como inflamação da glândula e prepúcio do parceiro sexual causada por leveduras (vulvite e balanite por *Candida*).

FLUCONAZOL

Indicação: tratamento de candidíase oral, vaginal; casos de - Tinea corporis; Tinea cruris; Tinea pedis (pé-de-atleta).

ITRACONAZOL

Indicação: tratamento de candidíase oral, orofaríngea, vaginal; casos de - Tinea corporis; Tinea cruris; Tinea pedis (pé-de-atleta); Tinea manuum; Tinea versicolor (pitiríase versicolor).

MICONAZOL, NITRATO

Indicação: tratamento de candidíase oral, cutânea, vaginal; casos de - Tinea corporis; Tinea cruris; Tinea pedis (pé-de-atleta); Tinea versicolor (pitiríase versicolor).

NISTATINA

Indicação: tratamento de candidíase oral e vaginal.

2.19 ANTI-HIPERTENSIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ANLODIPINO, BESILATO 5 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	BLOQUEADORES DE CANAIS DE CÁLCIO
2	ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
3	CAPTAPRIL 25 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
4	CARVEDILOL 3,125MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIHIPERTENSIVO/ANTIARRITMICO
5	CARVEDILOL 12,5MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTIHIPERTENSIVO/ANTIARRITMICO
6	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,150 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	AGONISTAS DOS RECEPTORES ADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL
7	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
8	ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
9	ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO
10	FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	DIURÉTICOS DE ALÇA
11	FUROSEMIDA 10MG/ML, (20MG/2ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML	USO INTERNO DAS UBS E URGÊNCIAS	DIURÉTICOS DE ALÇA
12	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG, DRÁGEA	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	VASODILADORES DIRETOS
13	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	DIURÉTICOS TIAZÍDICOS
14	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II

15	METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
16	NIFEDIPINA 20MG, COMPRIMIDO LIBERAÇÃO RETARDADA	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	ANTI-HIPERTENSIVO

ANLODIPINO, BESILATO

Indicação: na hipertensão arterial; angina do peito.

ATENOLOL

Indicação: controle da angina do peito crônica, arritmias cardíacas e hipertensão arterial. No tratamento do infarto do miocárdio.

CAPTOPRIL

Indicação: no tratamento da hipertensão; na insuficiência cardíaca juntamente com diuréticos e digitálicos; infarto do miocárdio, como terapia pós infarto e também na nefropatia diabética.

CARVEDILOL

Carvedilol é indicado para tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca congestiva estável e sintomática leve, moderada e grave, de etiologia isquêmica e não isquêmica.

CLONIDINA, CLORIDRATO

Indicação: hipertensão arterial; na redução da pressão intraocular; redução de rubores da menopausa; atenuar a recorrência de crises de enxaqueca. Atua, também, no tratamento de dependentes auxiliando na retirada de drogas, usado como coadjuvante.

PROPRANOLOL, CLORIDRATO

Indicação: no controle de hipertensão; de angina pectoris; das arritmias cardíacas; do tremor essencial; da ansiedade e taquicardia por ansiedade; controle da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva; profilaxia da enxaqueca; controle adjuvante da tireotoxicose e crise tireotóxica; da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva; controle de feocromocitoma, com início indicado, na presença de um bloqueio alfa efetivo.

ENALAPRIL, MALEATO

Indicação: no tratamento da hipertensão; na insuficiência cardíaca juntamente com diuréticos e digitálicos; infarto do miocárdio, como terapia pós infarto.

ESPIRONOLACTONA

Indicação: em conjunto com outros diuréticos, no tratamento da hipertensão; edema; hirsutismo feminino; ovário policístico; hipopotassemia; hiperaldosteronismo primário e secundário.

FUROSEMIDA

Indicação: na hipertensão arterial, em conjunto com outros anti-hipertensivos; edema agudo de pulmão; insuficiência cardíaca crônica; cirrose hepática complicada por ascite; síndrome nefrótica; insuficiência renal.

HIDRALAZINA, CLORIDRATO

Indicação: insuficiência cardíaca congestiva; pré-eclâmpsia ou eclâmpsia; hipertensão arterial.

HIDROCLOROTIAZIDA

Indicação: hipertensão arterial; edemas associados a insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática e a terapia realizada por corticosteróides ou estrógenos.

LOSARTANA

Indicação: hipertensão arterial; insuficiência cardíaca em pacientes que não se adequam ao tratamento com inibidores da ECA, sendo esse ineficaz.

METILDOPA

Indicação: tratamento de hipertensão (leve, moderada ou grave).

NIFEDIPINA

Indicação: tratamento de hipertensão arterial; tratamento de doença arterial coronária. Angina do peito crônica estável (angina de esforço).

2.20 ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G, CREME, BISNAGA 10 G.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	CORTICOSTEROIDES
2	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2,5 ML	USO INTERNO DAS UBS.	CORTICOSTEROIDES
3	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2,5 ML	USO INTERNO DAS UBS.	CORTICOSTEROIDES
4	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 100 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	USO INTERNO DAS UBS.	CORTICOSTEROIDES
5	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA.	USO INTERNO DAS UBS.	CORTICOSTEROIDES
6	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 60ML+ MEDIDOR.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	CORTICOSTEROIDES
7	PREDNISONA 5 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	CORTICOSTEROIDES
8	PREDNISONA 20 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	CORTICOSTEROIDES

DEXAMETASONA, ACETATO.

Indicação: utilizado como anti- inflamatório e imunossupressor, principalmente para tratamento intensivo, realizados em períodos mais curtos.

DEXAMETASONA, FOSFATO

Indicação: no tratamento de condições em que se deseja uma resposta anti-inflamatória e imunossupressora dos corticosteroides, principalmente em períodos curtos, de tratamento intensivo. Nas indicações específicas, casos em que a terapia necessária será por injeção intravenosa ou intramuscular: insuficiência adrenocortical primária; insuficiência adrenocortical relativa; proteção pré e pós-operatória; tireoidite subaguda; choque; distúrbios reumáticos;

doença do colágeno; doenças dermatológicas; estados alérgicos; oftalmopatias; doenças gastrointestinais; doenças respiratórias; distúrbios hematológicos; doenças neoplásicas; estados edematosos; edema cerebral; várias (meningite tuberculosa com bloqueio subaracnóide ou bloqueio iminente, quando simultaneamente acompanhado por adequada quimioterapia antituberculosa, triquinose com comprometimento neurológico ou miocárdico.); prova diagnóstica da hiperfunção adrenocortical; síndrome da angústia respiratória do recém-nascido: profilaxia pré-natal. Por injeção intra-articular ou nos tecidos moles: como terapia auxiliar para administração a curto prazo (para apoio do paciente durante episódio agudo ou exacerbação) em sinovite da osteoartrite, artrite reumatóide não especificada, bursite aguda e subaguda, artrite gotosa aguda, epicondilite, tenossinovite aguda inespecífica, osteoartrite pós-traumática. Por injeção intralésional: cicatriz quelóides, lesões inflamatórias localizadas hipertróficas, infiltradas de líquen plano, psoríase vulgar em placas, granuloma anular e líquen simples crônico (neurodermatite), lúpus eritematoso discoide, Necrobiosis lipoidica diabetorum, alopecia areata. Pode também ser útil em tumores císticos de aponeurose ou tendão (gânglios). Por injeção intravenosa: pacientes com COVID-19 grave (saturação de oxigênio < 90% em ar ambiente, sinais de pneumonia, sinais de desconforto respiratório grave) ou crítica (necessidade de tratamento de manutenção da vida, síndrome do desconforto respiratório agudo, sepse, choque séptico).

HIDROCORTISONA, HEMISSUCCINATO

Indicação: asma brônquica; reação alérgica grave; colite ulcerativa; edema angioneurótico (angioedema); insuficiência suprarrenal; pênfigo; lúpus eritematoso.

PREDNISOLONA

Indicação: tratamento de condições endócrinas, e como terapia de algumas neoplasias. Indicado como agente anti-inflamatório e imunossupressor em distúrbios com mecanismos fisiopatológicos que possuam processos inflamatórios e/ou autoimunes.

PREDNISONA

Indicação: tratamento de diversas doenças que geram inflamação grave-endócrinas, osteomusculares, reumáticas, do colágeno, dermatológicas, alérgicas, oftálmicas, respiratórias, hematológicas, neoplásicas.

2.21 ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL	USO INTERNO DAS UBS.	ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL
2	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL
3	IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS, FRASCO 30ML.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL
4	IBUPROFENO 600 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL

DICLOFENACO DE SÓDIO

Indicação: no tratamento de formas degenerativas e inflamatórias de reumatismo: artrite reumatóide; espondilite anquilosante; osteoartrite e espondilartrite; síndromes dolorosas da coluna vertebral; reumatismo não articular; crises agudas de gota; inflamações pós-traumáticas e pós-operatórias dolorosas e edema, como por exemplo, após cirurgia dentária ou ortopédica; condições inflamatórias e/ou dolorosas em ginecologia, como por exemplo, dismenorreia primária ou anexite; auxilia no tratamento de processos infecciosos acompanhados de dor e inflamação de ouvido, nariz ou garganta, como por exemplo, faringoamigdalites, otites.

DICLOFENACO, POTÁSSICO

Indicação: estados dolorosos inflamatórios pós-traumáticos como, por exemplo, os causados por entorses; uso na dor e inflamação no pós-operatório como, exemplo, após cirurgias ortopédicas ou odontológicas; em condições dolorosas e, ou inflamatórias em ginecologia como a menstruação dolorosa primária ou inflamação dos anexos uterinos; síndromes dolorosas da coluna vertebral; reumatismo não articular; como auxiliar no tratamento de processos infecciosos graves acompanhados de dor e inflamação em ouvido, nariz ou garganta.

IBUPROFENO

Indicação: tratamento da artrite reumatoide, osteoartrite, reumatismo articular, traumas no sistema musculoesquelético, amenizando os sinais e sintomas em decorrência de componentes inflamatórios e dolorosos que possam estar presentes. Alívio da dor após procedimentos cirúrgicos.

2.22 ANTIPARASITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	ANTIPROTOZOÁRIOS
2	IVERMECTINA 6 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	ANTI-HELMÍNTICOS
3	MEBENDAZOL 100MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	ANTIPARASITÁRIO
4	MEBENDAZOL 20MG/ML, (100MG/5ML) SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	ANTIPARASITÁRIO

ALBENDAZOL

Indicação: tratamento de infecções parasitárias ocasionadas por *Ascaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis*, *Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale*, *Trichuris trichiura*, *Strongyloides stercoralis*, *Taenia spp.* e *Hymenolepis nana*. Também é utilizado para a opistorquíase (*Opisthorchis viverrini*) e a larva migrans cutânea, além de giardíase (*Giardia lamblia*, *G. duodenalis*, *G. intestinalis*) infantil.

IVERMECTINA

Indicação: estrogiloidíase intestinal (infecção por *Strongyloides stercoralis*); oncocercose (infecção por *Onchocerca volvulus*); filariose (infecção por *Wuchereria bancrofti*); escabiose, sarna (infecção por *Sarcoptes scabiei*); pediculose (*Pediculus capitis*).

MEBENDAZOL

Indicação: uso como anti-helmíntico polivalente, com a finalidade de tratar infestações isoladas ou mistas, causadas por *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Enterobius vermicularis*, *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*, *Taenia solium* e *Taenia saginata*.

2.23 ANTIPARKINSONIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
2	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS
3	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	AGENTES DOPAMINÉRGICOS

CARBIDOPA + LEVODOPA

Indicação: tratamento da doença e da síndrome de Parkinson. Alívio da rigidez e bradicinesia do parkinsonismo. Utilizado, frequentemente, no controle do tremor, da disfagia, da sialorréia e da instabilidade postural, ligados com a doença e a síndrome de Parkinson.

LEVODOPA + BENSERAZIDA

Indicação: tratamento para a doença de Parkinson.

2.24 ANTISSECRETORES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULA.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	ANTISSECRETORES

OMEPRAZOL

Indicação: úlceras pépticas benignas, gástricas ou duodenais. Em casos de hiperacidez gástrica, prevenindo que úlceras gástricas ou duodenais reapareçam na síndrome de Zollinger-Ellison. Faz parte do esquema para supressão do *Helicobacter pylori*, protege a mucosa gástrica contra prejuízos possíveis de serem ocasionados por anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e também protege na esofagite de refluxo, em crianças com mais de um ano de idade.

2.25 ANTIVIRAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ACICLOVIR 200MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
2	ACICLOVIR 50MG/G – POMADA – BISNAGA 10 G	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

ACICLOVIR

Indicação: tratamento de infecções causadas por *Herpes simplex* na pele e mucosas, incluindo herpes genital recente e de repetição. Em imunocompetentes, indica-se para suprimir casos recorrentes e em imunocomprometidos como medida profilática. Para o tratamento de infecções pelo *Herpes zoster*.

2.26 ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	PERMETRINA 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS
2	PERMETRINA 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS

PERMETRINA

Indicação: tratamento de pediculose do couro cabeludo (piolho); escabiose (sarna).

2.27 HIPOLIPEMIANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	SINVASTATINA 10 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	HIPOLIPEMIANTES
2	SINVASTATINA 20 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	HIPOLIPEMIANTES

SINVASTATINA

Indicação: hiperlipidemia - para diminuir os altos valores de colesterol total e LDL-colesterol em pacientes com hipercolesterolemia primária; hipercolesterolemia combinada e hipertrigliceridemia, quando a hipercolesterolemia for a anormalidade mais preocupante.

2.28 HORMÔNIOS SEXUAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ENANTATO DE NORESTISTERONA 50MG/ML + VALERATO ESTRADIOL 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	CONTRACEPTIVOS
2	ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG – CARTELA 21 COMPRIMIDOS	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	CONTRACEPTIVOS
3	LEVONORGESTREL 0,75MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	CONTRACEPTIVOS
4	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 1ML	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	CONTRACEPTIVOS
5	NORETISTERONA 0,35 MG - CARTELA COM 35 CPD	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	CONTRACEPTIVOS

ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL

Indicação: prevenção da gravidez e controle de irregularidades menstruais.

ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL

Indicação: prevenção da gravidez e controle de irregularidades menstruais.

LEVONORGESTREL

Indicação: prevenção de gravidez, após uma relação sexual sem proteção por método contraceptivo, ou se há suspeita de falha do método anticoncepcional usado.

MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO

Indicação: prevenção da gravidez e controle de irregularidades menstruais.

NORETISTERONA

Indicação: prevenção da gravidez e controle de irregularidades menstruais, tais como tratamento das hemorragias uterinas disfuncionais, dismenorria, tensão pré-menstrual, algias pélvicas, mastodínia, distúrbios da fertilidade por insuficiência progesterônica.

2.29 HORMÔNIOS TIREOIDIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
2	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS
3	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS

LEVOTIROXINA

Indicação: hipotireoidismo; bócio; câncer de tireóide.

2.30 INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	HIPOGLICEMIANTES
2	GLICLAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	HIPOGLICEMIANTES
3	GLIMEPIRIDA 2MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	HIPOGLICEMIANTES
4	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA OU CANETA	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	INSULINAS
5	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML OU CANETA	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	INSULINAS
6	METFORMINA 850MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	HIPOGLICEMIANTES

GLIBENCLAMIDA

Indicação: diabetes mellitus tipo 2, tratamento oral para não insulino-dependente, quando a dieta, exercício físico e perda de peso são insuficientes no controle da glicose sanguínea.

GLICLAZIDA

Indicação: diabetes mellitus tipo 2, tratamento oral para não insulino-dependente; diabetes no obeso; diabetes no idoso; diabetes com complicações vasculares.

GLIMEPIRIDA

Indicação: diabetes mellitus tipo 2, tratamento oral para não insulino-dependente, quando a dieta, exercício físico e perda de peso são insuficientes no controle da glicose sanguínea.

INSULINA HUMANA NPH

A insulina isofana NPH, é uma insulina humana recombinante (princípio ativo), seu início de ação ocorre gradualmente e de forma longa, de 1 a 2 horas, com ação máxima após 4 a 12 horas. A

administração é exclusiva por via subcutânea, com duração de ação de 16 a 24 horas. Como mecanismo de ação, reduz os níveis de glicose (glicemia) no sangue ao facilitar a captação de glicose pelos receptores das células musculares e lipídicas. Ao mesmo tempo impede que a glicose seja liberada pelo fígado.

Faz-se administração por via subcutânea. Na coxa, a injeção subcutânea fornece uma absorção mais lenta e com menor variação em comparação a outros locais de aplicação. Se conveniente, utilizar o abdômen, a região glútea ou a região deltóide. Uma prega feita na pele, onde será administrado, reduz o risco de aplicação intramuscular. Indica-se sempre alternar as regiões de aplicação da injeção, para que a lipodistrofia seja evitada.

Indicação: tratamento de diabetes mellitus.

INSULINA HUMANA REGULAR

É um antidiabético, insulina exógena. Permite a redução dos níveis de glicose (glicemia) no sangue ao facilitar a captação de glicose após a ligação da insulina aos seus receptores das células musculares e lipídicas, além de impedir simultaneamente que a glicose seja liberada pelo fígado. Age rapidamente, ação inicial dentro de 30 minutos, aproximadamente. Seu pico de ação ocorre entre 1 a 5 horas, com duração de 6 a 10 horas. A insulina humana regular deve ser administrada meia hora antes de uma refeição, sendo compatível com outras insulinas, podendo ser feita associação com aquelas de ação prolongada.

Faz-se uso subcutâneo ou intravenoso. Administração por via subcutânea na parede abdominal (absorção mais rápida), pode-se usar coxa, região glútea ou a região do deltóide, também. Indica-se sempre alternar as regiões de aplicação da injeção, para que a lipodistrofia seja evitada. Indicação: tratamento de diabetes mellitus, também, em cetoacidose diabética; coma diabético.

METFORMINA

Indicação: diabetes mellitus tipo 2 - não dependente de insulina. Tratamento associado ao regime alimentar e indicado para uso isolado ou em conjunto com outros antidiabéticos, tais como as sulfonilureias. Na diabetes mellitus tipo 1, dependente de insulina, somado a insulino-terapia, em situações de diabetes não controlada ou insulino-resistente. Em pacientes com sobrepeso e pré-diabéticos, recomendado como prevenção de diabetes mellitus tipo 2. Também, indicado na Síndrome dos Ovários Policísticos (Síndrome de Stein-Leventhal).

2.31 LAXATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÓLEO MINERAL PURO, FRASCO 100 ML + MEDIDOR.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	LAXATIVOS

ÓLEO MINERAL PURO

Indicação: constipação intestinal. Lubrifica a massa fecal e a mucosa intestinal.

2.32 MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CARVEDILOL 3,125 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
2	CARVEDILOL 12,5 MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS
3	DIGOXINA 0,25 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	GLICOSÍDEOS CARDÍACOS

CARVEDILOL

Indicação: hipertensão arterial, utilizado isolado ou em associação com outros anti hipertensivos, principalmente diuréticos tiazídicos; crises de angina do peito; insuficiência cardíaca congestiva-tratamento adjunto.

DIGOXINA

Indicação: insuficiência cardíaca congestiva, e de algumas arritmias; taquicardia atrial paroxística; fibrilação atrial (para controle da variação da resposta ventricular).

2.33 MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CHOQUE

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	EPINEFRINA, CLORIDRATO 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML..	USO INTERNO DAS UBS.	ESTIMULANTES CARDÍACOS

CLORIDRATO DE EPINEFRINA

Indicação: tratamento de choque grave devido a uma reação alérgica grave (hipersensibilidade) ou colapso; choque anafilático; parada cardíaca; asma brônquica. Controle de pequenas hemorragias cutâneas; glaucoma simples (ângulo aberto); para relaxamento e inibição da contração da musculatura uterina.

2.34 MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	INIBIDORES DA REABSORÇÃO ÓSSEA

ALENDRONATO DE SÓDIO

Indicação: tratamento de osteoporose em mulheres na pós-menopausa; na osteoporose prevenindo fraturas.

2.35 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA OCULAR

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	Timolol 0,5% - solução oftálmica - frasco com 5mL	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	AGENTES BETABLOQUEADORES

TIMOLOL, MALEATO

Indicação: tratamento da pressão intraocular elevada. Demonstrou em estudos clínicos, redução da pressão intraocular em pacientes com hipertensão ocular; com glaucoma crônico de ângulo aberto; em alguns pacientes com glaucoma secundário; pacientes com ângulos estreitos e histórico de fechamento de ângulo estreito espontâneo ou induzido iatrogenicamente no olho contralateral, em que se é necessário diminuir a pressão intraocular. Indicado como terapia adjunta, quando outra terapia antiglaucomatosa é ineficaz em pacientes com glaucoma pediátrico.

2.36 PREPARAÇÕES NASAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9%), SOLUÇÃO NASAL, SPRAY, FRASCO 50 ML	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	DESCONGESTIONANTES NASAIS

BENZALCÔNIO, CLORETO + CLORETO DE SÓDIO

É um descongestionante nasal de uso local, possui rápido início de ação vasoconstritora (cerca de 10 minutos) e com efeito prolongado (entre 2 a 6 horas).

Indicação: tratamento da congestão nasal para alívio dos sintomas em resfriados, quadros alérgicos nasais, rinites e rinossinusites.

2.37 SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML.	USO INTERNO DAS UBS	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
2	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 100 ML.	USO INTERNO DAS UBS	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
3	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 250 ML.	USO INTERNO DAS UBS	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
4	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 500 ML.	USO INTERNO DAS UBS	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
5	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 1000 ML.	USO INTERNO DAS UBS	SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO
6	GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10ML	USO INTERNO DAS UBS	ELETRÓLITOS, DILUENTES
7	SORO GLICOSADO À 5%, USO INTRAVENOSO, SISTEMA FECHADO, FRASCO OU BOLSA COM 250ML	USO INTERNO DAS UBS	ELETRÓLITOS, DILUENTES
8	SORO GLICOSADO À 5%, USO INTRAVENOSO, SISTEMA FECHADO, FRASCO OU BOLSA COM 500ML	USO INTERNO DAS UBS	ELETRÓLITOS, DILUENTES
9	SORO GLICOSADO À 5%, USO INTRAVENOSO, SISTEMA FECHADO, FRASCO OU BOLSA COM 1000ML	USO INTERNO DAS UBS	ELETRÓLITOS, DILUENTES

CLORETO DE SÓDIO

Indicação: uso para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. Terapia de reposição de água e eletrólitos em situações de alcalose metabólica com nível moderado, de carência de sódio e, também, diluente para medicamentos.

SORO GLICOSADO

Indicação: fonte de água, calorias e diurese osmótica, em casos de desidratação, reposição calórica, nas hipoglicemias e como veículo para diluição de medicamentos compatíveis.

2.38 SOLVENTES E AGENTES DILUENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10 ML.	USO INTERNO DAS UBS	DILUENTES
2	ÁGUA PARA INJEÇÃO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML.	USO INTERNO DAS UBS	DILUENTES
3	ÁGUA BIDEUTILADA ESTERILIZADA – SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO OU BOLSA COM 1000ML - SISTEMA FECHADO	USO INTERNO DAS UBS	DILUENTES

ÁGUA BIDEUTILADA ESTERILIZADA

Indicação: preparo de medicamentos usados em injeção, perfusão - injeção lenta(gota a gota).

2.39 SUBSTÂNCIAS MINERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (CÁLCIO ELEMENTAR 500 MG), COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	SUPLEMENTOS MINERAIS
2	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FÓRMULA DA OMS), PÓ, ENVELOPE 27,9 G.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	SUPLEMENTOS MINERAIS

CARBONATO DE CÁLCIO

Indicação: antiácido; suplementação na alimentação; na hipocalcemia resultante do hipoparatiroidismo ou má absorção (intravenosa para tetania aguda); na prevenção e tratamento da osteoporose; arritmias cardíacas causadas por hipercalemia grave.

SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL

Indicação: prevenção da desidratação e manutenção da hidratação após a fase de reidratação em quadros de doença diarreica aguda.

2.40 VITAMINAS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	POLIVITAMÍNICO SOLUÇÃO ORAL, CONTENDO NO MÍNIMO VIT. A + VIT. B1+ VIT. B2 + VIT. B5 + VIT. B6 + VIT. B8 + VIT. C+ VIT. D+ VIT. E, FRASCO COM 20ML	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	SUPLEMENTOS MINERAIS
2	POLIVITAMÍNICO, CONTENDO NO MÍNIMO: VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B6 + VITAMINA B12 + NICOTINAMIDA + VITAMINA B5 + ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) + VITAMINA E + ZINCO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	SUPLEMENTOS MINERAIS
3	VITAMINA B1 (TIAMINA, CLORIDRATO) 300MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	SUPLEMENTOS MINERAIS

POLIVITAMÍNICO

Indicação: para suprir os estados de deficiência de diversos elementos, algumas vezes associados ao estresse oxidativo.

VITAMINA B1

Indicação: tratamento e prevenção de Beribéri, síndrome de Wernicke-Korsakoff, neurites e polineurites (como tratamento adjuvante), necessidades aumentadas de vitamina B1 (gravidez, amamentação, pessoas idosas), neurites e cardiomiopatia causadas por consumo excessivo de álcool.

2.41 TRATAMENTO DE FERIDAS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AGE	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE	TRATAMENTO DE FERIDAS

AGE

Indicação: aplicação em pele íntegra para prevenção de úlcera por pressão; feridas agudas e crônicas, com ou sem infecção de qualquer etiologia; feridas com perda de tecido superficial e parcial; dermatite perilesões; queimaduras de primeiro e segundo graus; dermatites amoniacais; dermatites perigastrostomias; traqueostomias e drenos.

3.0 CLASSE TERAPÊUTICA/ GRUPO FARMACOLÓGICO – MEDICAÇÕES DISPENSADAS EXCLUSIVAMENTE NA FARMÁCIA CENTRAL

3.1 ANALGÉSICO-OPIÓIDE

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLORIDRATO DE TRAMADOL, 50mg, COMPRIMIDO	FARMÁCIA CENTRAL, APENAS PACIENTES ONCOLÓGICOS, SOB PROTOCOLO.	ANALGÉSICO

CLORIDRATO DE TRAMADOL

Cloridrato de tramadol é um analgésico que pertence à classe dos opióides que age no sistema nervoso central. Desta forma alivia a dor agindo nas células nervosas específicas da medula espinhal e cérebro

Essa medicação é dispensada na Farmácia Central sob protocolo, apenas para pacientes oncológicos.

PROTOCOLO:

A medicação é dispensada para a dor oncológica.

1. O paciente e/ou responsável deverá comparecer na comissão municipal de oncologia, localizada na 3º andar do PAM MARECHAL portando os seguintes documentos antes do primeiro atendimento para o cadastro:

1.1 Receita médica dos serviços de oncologia;

1.2 Identidade, Cartão Nacional de Saúde (CNS), CPF e comprovante de residência atualizado (original e cópia);

1.3 Cópia da última biópsia

1.4 O setor carimba a receita após a análise das documentações e encaminha para a Farmácia Central.

2. O paciente é direcionado para a Farmácia Central, onde ocorre a dispensação da medicação.

3. Para as demais dispensações apenas comparecer na Farmácia Central com os documentos e a receita original do serviço de oncologia original e uma cópia. A dispensação é feita a cada 30 dias.

3.2 ANSIOLÍTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLONAZEPAM 2,5mg/ML - solução oral- frasco com 20ml	FARMÁCIA CENTRAL	ANSIOLITICOS
2	NITRAZEPAM 5mg	FARMÁCIA CENTRAL	ANSIOLITICOS

CLONAZEPAM

É um medicamento usado para prevenir e tratar convulsões, transtorno do pânico, transtornos de ansiedade e o distúrbio do movimento conhecido como acatisia. É um tranquilizante da classe dos benzodiazepínicos.

NITRAZEPAM

Nitrazepam é fármaco benzodiazepínico, comercializado no Brasil. É hipnótico usado no tratamento de insônia, com propriedades sedativa e miorrelaxante, também como ansiolítico, amnésico, anticonvulsivante

3.3 ANTICONVULSIVANTE

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG, CÁPSULA OU COMPRIMIDO	FARMÁCIA CENTRAL	ANTICONVULSIVANTE
2	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML, COM DOSADOR GRADUADO, FRASCO C/ 100ML, XAROPE	FARMÁCIA CENTRAL	ANTICONVULSIVANTE
3	CARBAMAZEPINA 200MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIA CENTRAL	ANTICONVULSIVANTE
4	CARBAMAZEPINA 100MG/5ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 100ML	FARMÁCIA CENTRAL	ANTICONVULSIVANTE
5	FENITOÍNA 100MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIA CENTRAL	ANTICONVULSIVANTE

ÁCIDO VALPROICO

Indicação: casos de epilepsia, uso como monoterápico ou terapia adjuvante ao tratamento de pacientes com crises parciais complexas. Epilepsia, em quadros de ausência simples e complexa em pacientes adultos e crianças acima de 10 anos, além de terapia auxiliar em adultos e crianças acima de 10 anos com crises de múltiplos tipos, incluindo crises de ausência.

CARBAMAZEPINA

A carbamazepina é usada no tratamento de determinados tipos de crises convulsivas (epilepsias). É também usado no tratamento de algumas doenças neurológicas (como por exemplo, uma condição dolorosa da face chamada neuralgia do trigêmeo), tão bem quanto em determinadas condições psiquiátricas (tais como as conhecidas como episódios de mania de distúrbios do humor bipolar e um certo tipo de depressão). Não deve ser usado em dores comuns.

FENITOÍNA

Indicação: em casos de epilepsia, exceto crises de ausência; convulsões, neuralgia do trigêmeo.

3.4 ANTIDEPRESSIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25mg	FARMÁCIA CENTRAL	ANTIDEPRESSIVO
2	IMIPRAMINA, Cloridrato de 25mg comprimido revestido	FARMÁCIA CENTRAL	ANTIDEPRESSIVO
3	CARBONATO DE LÍTIO 300mg	FARMÁCIA CENTRAL	ANTIDEPRESSIVO
4	NORTRIPTILINA 25mg	FARMÁCIA CENTRAL	ANTIDEPRESSIVO
5	NORTRIPTILINA 50mg	FARMÁCIA CENTRAL	ANTIDEPRESSIVO

CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO

Indicação: fobia; síndrome do pânico e obsessivo-compulsiva; distúrbios de ansiedade; depressão mental; enurese e dor crônica.

IMIPRAMINA

Pertence ao grupo de medicamentos conhecidos como antidepressivos tricíclicos, que são usados para tratar depressão e distúrbios do humor. Estados de pânico, dores crônicas e incontinência urinária noturna em crianças acima de 5 anos de idade são outras condições psicológicas que podem ser tratadas com Imipramina.

CLORIDRATO DE LÍTIO

Indicação: é usado como um estabilizador do humor no tratamento psiquiátrico de estados de mania e distúrbio bipolar.

NORTRIPTILINA

Indicação: é um medicamento antidepressivo tricíclico que serve para tratar casos de transtorno depressivo maior, transtorno depressivo recorrente, entre outras condições.

3.5 ANTIFÚNGICO

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	NISTATINA 25.000/g (ou 100.000UI/4g), Creme Vagina, Bisnaga com 60g + Aplicador	FARMÁCIA CENTRAL	ANTIFÚNGICO

NISTATINA

Indicação: é um antifúngico, um produto destinado a combater os fungos, entre eles um muito comum em recém-nascidos e lactentes, A nistatina age no combate a fungos sensíveis a este medicamento, como Candida albicans (monília ou sapinho) e outros.

3.6 ANTIPARKISONIANO

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BIPERIDENO, Cloridrato de 2mg	FARMÁCIA CENTRAL	ANTIPARKISONIANO

BIPERIDENO

Indicação: tratamento da síndrome parkinsoniana, atua nos sintomas de rigidez e tremor; nas distonias agudas, acatisia; síndromes parkinsonianas desencadeada por neurolépticos e fármacos semelhantes.

3.7 ANTIPSICÓTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	HALOPERIDOL 2mg/ml (2%)- solução oral- frasco conta gotas com 200ml	FARMÁCIA CENTRAL	ANTIPSICÓTICO
2	HALOPERIDOL 5mg comprimido	FARMÁCIA CENTRAL	ANTIPSICÓTICO
3	MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 25mg, comprimido	FARMÁCIA CENTRAL	ANTIPSICÓTICO
4	CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA 100mg, comprimidos	FARMÁCIA CENTRAL	ANTIPSICÓTICO
5	CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA 25mg, comprimidos	FARMÁCIA CENTRAL	ANTIPSICÓTICO
6	CLOPROMAZINA, CLORIDRATO 40mg/ml- solução oral- frasco- com 20 ml	FARMÁCIA CENTRAL	ANTIPSICÓTICO

HALOPERIDOL

Indicação: na esquizofrenia, nos delírios e alucinações; na confusão mental aguda (agente antipsicótico); em casos de mania, demência; agitação e agressividade no idoso; distúrbios graves do comportamento e nas psicoses infantis junto a agitação psicomotora; tiques motores; síndrome de Tourette.

MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA

Indicação: é um medicamento cuja ação esperada é a sedação e melhora de quadros mentais, como por exemplo, a ansiedade em pacientes psicóticos.

CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA

Indicação: no tratamento de curta duração da ansiedade e agitação psicomotora; neurotoxicoses em crianças, náuseas, vômitos e soluços intratáveis; tiques motores; em casos de psicoses prolongadas e quadros psiquiátricos agudos.

4.0 CLASSE TERAPÊUTICA/ GRUPO FARMACOLÓGICO – MEDICAÇÕES DISPENSADAS NAS REGIONAL LESTE – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

No Departamento de Urgência Regional Leste ocorre a dispensação de alguns medicamentos para pacientes que receberam alta ou para aqueles que tiveram atendimento neste local.

4.1 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DIPIRONA SÓDICA 500 MG, COMPRIMIDO	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
2	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 10 ML.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
3	PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 15 ML.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
4	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

DIPIRONA SÓDICA

Indicação: age minimizando febre e dores.

PARACETAMOL

Indicação: age minimizando febre e dores.

4.2 ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO

Indicação: febre; dor. Porém, seu uso clínico está mais relacionado a sua ação cardiovascular, uma vez que é capaz de diminuir a agregação plaquetária.

4.3 ANTI-HISTAMÍNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG, COMPRIMIDO	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANTI-HISTAMÍNICOS
2	LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANTI-HISTAMÍNICOS

DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO

Indicação: para alergia, urticária, dermatite e rinite alérgica.

LORATADINA

Indicação: alívio de sintomas gerados na rinite alérgica e na urticária idiopática crônica.

4.4 ANTIASMÁTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMINOFILINA 100MG, COMPRIMIDO	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	BRONCODILADORES
2	FENOTEROL 5 MG/ML, SOLUÇÃO, FRASCO GOTEJADOR	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANTIARRÍTMICOS
3	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANTICOLINÉRGICOS
4	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/JATO, AEROSOL, FRASCO 200 DOSES.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	BRONCODILADORES

AMINOFILINA

A aminofilina é um broncodilatador, antiasmático.

Indicação: tratamento de doenças caracterizadas por broncoespasmo, principalmente a asma brônquica ou o broncoespasmo associado com bronquite crônica e enfisema

FENOTEROL, BROMIDRATO

É um broncodilatador que ao estimular os receptores beta adrenérgicos, no pulmão, fazem com que o músculo liso dos brônquios relaxem.

Indicação: em broncoespasmos associados a asma, tanto em crises agudas e brônquicas, quanto na prevenção de asma ocasionadas por atividades físicas. Também, trata e previne broncoespasmos causados por bronquite crônica, enfisema pulmonar e doença pulmonar obstrutiva crônica.

BROMETO DE IPRATRÓPIO

Sua ação ocorre no pulmão, na musculatura lisa dos brônquios ao antagonizar a acetilcolina e dilatar os brônquios.

Indicação: para tratar broncoespasmo relacionado a bronquite crônica, enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, além da asma, em ação conjunta com outros broncodilatadores.

SALBUTAMOL, SULFATO

É um broncodilatador com baixa durabilidade em quadros de obstrução reversível das vias aéreas, na asma, bronquite crônica e enfisema. Não sendo a principal escolha para tratar casos graves e pouco estáveis. Tem a capacidade de relaxar o músculo liso dos brônquios levando a uma broncodilatação ao causar estímulo nos receptores beta 2 nos pulmões.

Indicação: prevenir e tratar broncoespasmo em caso de bronquite crônica; enfisema pulmonar; doença pulmonar obstrutiva crônica e em casos de broncoespasmo relacionado a esforço físico, atuar na prevenção.

4.5 ANTIBACTERIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	PENICILINAS
2	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	PENICILINAS
3	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	MACROLÍDEOS
4	CEFALEXINA 500MG, COMPRIMIDO OU CÁPSULA EM BLISTER	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	CEFALOSPORINAS
5	CIPROFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	QUINOLONAS
6	CLARITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	MACROLÍDEOS
7	METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDO.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANTIBACTERIANOS/ ANTIPROTOZOÁRIO
8	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G, POMADA, BISNAGA COM 10G.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANTIBACTERIANOS DE USO USO TÓPICO
9	NITROFURANTOÍNA 100 MG, CÁPSULA GELATINOSA.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	OUTROS ANTIBACTERIANOS
10	SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1%, CREME,	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANTIBACTERIANOS DE USO TÓPICO
11	SULFAMETAXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG, COMPRIMIDO	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	OUTROS ANTIBACTERIANOS
12	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO CONTA GOTAS COM 5ML	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	OUTROS ANTIBACTERIANOS

AMOXICILINA

É uma penicilina usada como antibacteriano que atende uma grande variedade de espécies gram-positivas e gram-negativas.

Indicação: é utilizado na prevenção da endocardite bacteriana; tratamento da amigdalite; otite média; sinusite; gonorreia; infecção urinária, odontogênica, da pele e no trato respiratório baixo. Também é indicado nas infecções por Chlamydia em grávidas, na doença de Lyme, gastrite por Helicobacter pylori; úlcera péptica por Helicobacter pylori.

AMOXICILINA, ÁCIDO CLAVULÂNICO

Trata-se de uma penicilina que atende um grande variedade de espécies gram-positivas e gram-negativas. A amoxicilina também é encontrada em associação ao ácido clavulânico, que é produzido por meio da fermentação do *Streptomyces clavuligerus*, sendo um inibidor de betalactamases, melhorando a eficácia da amoxicilina.

Indicação: em infecções urinárias, odontogênicas, de pele, ainda para amigdalite, sinusite e vaginite.

AZITROMICINA, DI-HIDRATADA

Antibacteriano pertencente à família dos macrolídeos.

Indicação: em casos de infecção do trato respiratório inferior, bronquite e pneumonia; em casos de infecção do trato respiratório superior, sinusite e faringite/tonsilite. No tratamento de infecções genitais não complicadas devido a *Chlamydia trachomatis* e a *Neisseria gonorrhoeae* (ausência de resistência múltipla). Indicado no tratamento de cancro em *Haemophilus ducreyi*.

CEFALEXINA, MONOHIDRATADA

Faz parte dos betalactâmicos, sendo uma cefalosporina de primeira geração. Tem a capacidade de impedir a síntese da parede celular bacteriana, agindo em um amplo espectro contra Gram positiva e Gram negativa, além de ter rápida absorção.

Indicação: em infecções trato geniturinário; óssea; de pele e tecido mole; orofacial por anaeróbicos e por cocos Gram-positivos; pneumonia; otite média; faringite; amigdalite.

CLARITROMICINA

Trata-se de um antibacteriano, da família dos macrolídeos.

Indicação: na faringite; amigdalite; pneumonia; sinusite; na infecção orofacial causada por anaeróbicos ou por cocos Gram positivos; em infecções das vias aéreas superiores e inferiores, além de infecções da pele e tecidos moles, ocasionados por microrganismos sensíveis à claritromicina. Também é indicada no tratamento de infecções provocadas por *Mycobacterium avium* ou *Mycobacterium intracellulare* (disseminadas ou localizadas) e *Mycobacterium chelonae*, *Mycobacterium fortuitum* ou *Mycobacterium kansasii* (localizadas).

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO

É um agente antibacteriano fluoroquinolônico sintético.

Indicação: tratamento de infecções complicadas e não complicadas ocasionadas por microrganismos sensíveis ao ciprofloxacino. - Infecções do trato genito-urinário. Trato respiratório: o cloridrato de ciprofloxacino Possível tratamento de escolha, no trato respiratório, em caso de pneumonias causadas por *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Proteus spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella catarrhalis*, *Legionella spp.* e *Staphylococcus*. Não deve ser considerado como primeira escolha em casos de pacientes ambulatoriais com pneumonia causada por *Pneumococcus*. Recomendado para tratamento da otite média e sinusite, principalmente se a infecção for causada por organismos gram-negativos, inclusive *Pseudomonas aeruginosa* ou *Staphylococcus*.

METRONIDAZOL

É um antimicrobiano e antiprotozoário. Possui boa atuação em várias doenças protozoárias e infecções bacterianas ao causar morte celular dessas, agindo sobre o DNA. Alcança sua absorção máxima entre 8 e 12 horas, com meia vida plasmática de aproximadamente 8 a 10 horas. O consumo de bebida alcoólica e metronidazol não é recomendado.

Indicação: em infecção oral causada por microrganismos anaeróbicos, tais como *Bacteroides*, *Clostridium spp* e alguns estreptococos; periodontite por *Actinobacillus actinomycetemcomitans*; tricomoníase; vaginite por *Gardnerella vaginalis*.

NEOMICINA + BACITRACINA

O sulfato de neomicina + bacitracina zínica é um medicamento formado pela associação de dois antibióticos de uso local, sem administração por via sistêmica.

Indicação: tratamento de infecções bacterianas da pele e de mucosas, causadas por microorganismos sensíveis: piodermites, impetigo, eczemas infectados, otite externa, infecções da mucosa nasal, furúnculos, antraz, ectima, abscessos, acne infectada, intertrigo, úlceras cutâneas e queimaduras infectadas. Na profilaxia de infecções cutâneo-mucosas provenientes de ferimentos cortantes (inclusive cirúrgicos), abrasões, queimaduras pouco extensas, dentre outros.

NITROFURANTOÍNA

É um agente antibacteriano, com atividade em diversos microrganismos Gram positivos e Gram negativos. É capaz de causar danos ao DNA bacteriano, modificando ou inativando suas proteínas. Sua absorção é feita rapidamente na forma microcristalina, porém demonstra uma menor irritação gastrointestinal na sua forma macrocristalina.

Indicação: limita-se ao tratamento de infecções do trato urinário.

SULFADIAZINA DE PRATA

Tem ação bactericida, sendo capaz de atuar na parede celular bacteriana, também demonstra eficiência contra fungos. Sua aplicação é feita de forma tópica, tratando, por exemplo, queimaduras infectadas.

Indicação: em feridas infectadas.

SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA

Indicação: em casos de infecção gênito-urinária, renal, respiratória, bronquite crônica, na otite média, em alguns casos de pneumonia. Além de uso na toxoplasmose.

TOBRAMICINA

Antibacteriano, pertencente a classe dos aminoglicosídeos. Estudos realizados in vitro, indicaram que a tobramicina é ativa contra cepas sensíveis dos seguintes microrganismos: Staphylococci, inclusive *S. aureus* e *S. epidermidis* (coagulase positivos e coagulase negativos), incluindo cepas resistentes à penicilina. Streptococci, além de algumas espécies do grupo A beta-hemolítico, algumas espécies não hemolíticas e algumas cepas de *Streptococcus pneumoniae*. *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter aerogenes*, *Proteus mirabilis*, *Morganella morganii*, maioria das cepas de *Proteus vulgaris*, *Haemophilus influenzae* e *H. aegyptius*, *Moraxella lacunata*, *Acinetobacter calcoaceticus* e algumas espécies de *Neisseria*. Os estudos de sensibilidade bacteriana indicaram que muitos microrganismos resistentes à gentamicina mantêm a sensibilidade à tobramicina.

Indicação: tratamento de infecções externas dos olhos e seus anexos, causadas por bactérias sensíveis à tobramicina.

4.6 ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	AGENTES PROCINÉTICOS

METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO

Trata-se de um antiemético, capaz de aumentar a motilidade do esôfago, do estômago e do intestino, assim, sua ação agiliza o esvaziamento do estômago e estimula o trânsito intestinal.

Indicação: vômito; náusea; refluxo gastro-esofágico; vômitos provocados por uremia, radiação, distúrbios gastrointestinais, citotóxicos.

4.7 ANTIESPASMÓDICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANTIESPASMÓDICOS

ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO

Indicação: úlcera estomacal e duodenal; cólica.

4.8 ANTIFÚNGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CETOCONAZOL 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANTIFÚNGICO
3	FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA.	REGIONAL LESTE – AMBULATÓRIO	ANTIFÚNGICO
4	NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANTIFÚNGICO

CETOCONAZOL

Indicação: tratamento de candidíase oral, vaginal, disseminada; dermatite seborréica; casos graves de - Tinea corporis; Tinea cruris; Tinea pedis (pé-de-atleta); Tinea versicolor (pitiríase versicolor).

FLUCONAZOL

Indicação: tratamento de candidíase oral, vaginal; casos de - Tinea corporis; Tinea cruris; Tinea pedis (pé-de-atleta).

NISTATINA

Indicação: tratamento de candidíase oral e vaginal.

4.9 ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G, CREME, BISPAGA 10 G.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	CORTICOSTEROIDES
2	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 60ML+ MEDIDOR.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	CORTICOSTEROIDES
3	PREDNISONA 20 MG, COMPRIMIDO.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	CORTICOSTEROIDES

DEXAMETASONA, ACETATO.

Indicação: utilizado como anti- inflamatório e imunossupressor, principalmente para tratamento intensivo, realizados em períodos mais curtos.

PREDNISOLONA

Indicação: tratamento de condições endócrinas, e como terapia de algumas neoplasias. Indicado como agente anti-inflamatório e imunossupressor em distúrbios com mecanismos fisiopatológicos que possuam processos inflamatórios e/ou autoimunes.

PREDNISONA

Indicação: tratamento de diversas doenças que geram inflamação grave-endócrinas, osteomusculares, reumáticas, do colágeno, dermatológicas, alérgicas, oftálmicas, respiratórias, hematológicas, neoplásicas.

4.10 ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG, COMPRIMIDO	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL
2	IBUPROFENO 600 MG, COMPRIMIDO.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL

DICLOFENACO, POTÁSSICO

Indicação: estados dolorosos inflamatórios pós-traumáticos como, por exemplo, os causados por entorses; uso na dor e inflamação no pós-operatório como, exemplo, após cirurgias ortopédicas ou odontológicas; em condições dolorosas e, ou inflamatórias em ginecologia como a menstruação dolorosa primária ou inflamação dos anexos uterinos; síndromes dolorosas da coluna vertebral; reumatismo não articular; como auxiliar no tratamento de processos infecciosos graves acompanhados de dor e inflamação em ouvido, nariz ou garganta.

IBUPROFENO

Indicação: tratamento da artrite reumatoide, osteoartrite, reumatismo articular, traumas no sistema musculoesquelético, amenizando os sinais e sintomas em decorrência de componentes inflamatórios e dolorosos que possam estar presentes. Alívio da dor após procedimentos cirúrgicos.

4.11 ANTIPARASITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	IVERMECTINA 6 MG, COMPRIMIDO.	REGIONAL LESTE – AMBULATÓRIO	ANTI-HELMÍNTICOS

IVERMECTINA

Indicação: estrogiloidíase intestinal (infecção por *Strongyloides stercoralis*); oncocercose (infecção por *Onchocerca volvulus*); filariose (infecção por *Wuchereria bancrofti*); escabiose, sarna (infecção por *Sarcoptes scabiei*); pediculose (*Pediculus capitis*).

4.12 ANTIVIRAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ACICLOVIR 200MG, COMPRIMIDO	REGIONAL LESTE – AMBULATÓRIO	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

ACICLOVIR

Indicação: tratamento de infecções causadas por *Herpes simplex* na pele e mucosas, incluindo herpes genital recente e de repetição. Em imunocompetentes, indica-se para suprimir casos recorrentes e em imunocomprometidos como medida profilática. Para o tratamento de infecções pelo *Herpes zoster*.

4.13 SUBSTÂNCIAS MINERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FÓRMULA DA OMS), PÓ, ENVELOPE 27,9 G.	REGIONAL LESTE - AMBULATÓRIO	SUPLEMENTOS MINERAIS

SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL

Indicação: prevenção da desidratação e manutenção da hidratação após a fase de reidratação em quadros de doença diarreica aguda.

5. CLASSE TERAPÊUTICA/ GRUPO FARMACOLÓGICO – MEDICAÇÕES DISPENSADAS EXCLUSIVAMENTE NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER

As medicações dispensadas no Departamento de Saúde da Mulher são para pacientes que passaram por consultas no departamento.

5.1 HORMÔNIOS SEXUAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG/ML + VALERATO ESTRADIOL 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	CONTRACEPTIVOS
2	ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG – CARTELA 21 COMPRIMIDOS	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	CONTRACEPTIVOS
3	LEVONORGESTREL 0,75MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	CONTRACEPTIVOS
2	LEVONORGESTREL 1,5 MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	CONTRACEPTIVOS
4	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 1ML	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	CONTRACEPTIVOS
5	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO + ESTRADIOL CIPIONATO 50MG + 10MG/ML AMPOLA 0,5ML Suspensão Injetável	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	CONTRACEPTIVOS
6	NORETISTERONA 0,35 MG - CARTELA COM 35 CPD	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	CONTRACEPTIVOS

LEVONORGESTREL

É um contraceptivo de emergência. Seu mecanismo depende da fase do ciclo em que foi administrado. Cabe entre as formas de atuação: inibir ou atrasar a ovulação; modificar a motilidade tubária, deixando a passagem do óvulo e/ou do espermatozóide mais difícil; dificultar a entrada do espermatozóide no muco cervical. Não é capaz de agir interrompendo uma possível gravidez após a implantação da blástula no endométrio. Para garantir a eficácia é necessário que o uso seja feito em até 72 horas após coito desprotegido. Pílulas contraceptivas de emergência possuem eficácia menor que métodos contraceptivos regulares, de uso contínuo. A taxa de falha tende a aumentar, sendo cumulativa, se o levonorgestrel for usado em mais ocasiões.

Indicação: prevenção de gravidez, após uma relação sexual sem proteção por método contraceptivo, ou se há suspeita de falha do método anticoncepcional usado, como ruptura ou deslocamento do preservativo masculino ou feminino, que possa ter permitido contato do esperma na genitália feminina; deslocamento, ruptura ou remoção antecipada do diafragma ou capuz cervical; falha na interrupção do coito com contato do esperma na genitália feminina; cálculo incorreto do método periódico de abstinência; expulsão/extrusão de D.I.U ou implante subcutâneo em caso de ter ocorrido relação sexual desprotegida; em momento de uso incorreto da pílula anticoncepcional rotineira. Em situações de agressão sexual por meio de força física.

ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL

Indicação: prevenção da gravidez e controle de irregularidades menstruais.

ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL

Indicação: prevenção da gravidez e controle de irregularidades menstruais.

LEVONORGESTREL

Indicação: prevenção de gravidez, após uma relação sexual sem proteção por método contraceptivo, ou se há suspeita de falha do método anticoncepcional usado.

MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO

Indicação: prevenção da gravidez e controle de irregularidades menstruais.

NORETISTERONA

Indicação: prevenção da gravidez e controle de irregularidades menstruais, tais como tratamento das hemorragias uterinas disfuncionais, dismenorreia, tensão pré-menstrual, algias pélvicas, mastodínia, distúrbios da fertilidade por insuficiência progestínica.

5.2 ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIINFLAMATÓRIO
2	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIINFLAMATÓRIO
3	IBUPROFENO 600MG	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIINFLAMATÓRIO
4	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIINFLAMATÓRIO

DICLOFENACO, POTÁSSICO

Indicação: estados dolorosos inflamatórios pós-traumáticos como, por exemplo, os causados por entorses; uso na dor e inflamação no pós-operatório como, exemplo, após cirurgias ortopédicas ou odontológicas; em condições dolorosas e, ou inflamatórias em ginecologia como a menstruação dolorosa primária ou inflamação dos anexos uterinos; síndromes dolorosas da coluna vertebral; reumatismo não articular; como auxiliar no tratamento de processos infecciosos graves acompanhados de dor e inflamação em ouvido, nariz ou garganta.

DICLOFENACO DE SÓDIO

Indicação: no tratamento de formas degenerativas e inflamatórias de reumatismo: artrite reumatóide; espondilite anquilosante; osteoartrite e espondilartrite; síndromes dolorosas da coluna vertebral; reumatismo não articular; crises agudas de gota; inflamações pós-traumáticas e pós-operatórias dolorosas e edema, como por exemplo, após cirurgia dentária ou ortopédica; condições inflamatórias e/ou dolorosas em ginecologia, como por exemplo, dismenorreia primária ou anexite; auxilia no tratamento de processos infecciosos acompanhados de dor e inflamação de ouvido, nariz ou garganta, como por exemplo, faringoamigdalites, otites.

IBUPROFENO

Indicação: tratamento da artrite reumatoide, osteoartrite, reumatismo articular, traumas no sistema musculoesquelético, amenizando os sinais e sintomas em decorrência de componentes

inflamatórios e dolorosos que possam estar presentes. Alívio da dor após procedimentos cirúrgicos.

NIMESULIDA: Este medicamento é destinado ao tratamento de uma variedade de condições que requeiram atividade antiinflamatória, analgésica e antipirética.

5.3 ANTIBACTERIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	PENICILINAS
2	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	PENICILINAS
3	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	MACROLÍDEOS
4	CEFALEXINA 500MG, COMPRIMIDO OU CÁPSULA EM BLISTER	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	CEFALOSPORINAS
5	CIPROFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	QUINOLONAS
6	ESPIRAMICINA 500MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	MACROLÍDEOS
7	METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIBACTERIANOS/ ANTIPROTOZOÁRIO
8	METRONIDAZOL 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIBACTERIANOS/ ANTIPROTOZOÁRIO
9	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G, POMADA, BISNAGA COM 10G.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIBACTERIANOS DE USO USO TÓPICO
10	NITROFURANTOÍNA 100 MG, CÁPSULA GELATINOSA.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	OUTROS ANTIBACTERIANOS
11	SULFADIAZINA 500MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	SULFAMIDA
12	TETRACICLINA 25G/G + ANFOTERICINA B 12,5G/G - CREME VAGINAL - BISNAGA COM 45G + APLICADOR	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	PENICILINAS

AMOXICILINA

É uma penicilina usada como antibacteriano que atende uma grande variedade de espécies gram-positivas e gram-negativas.

Indicação: é utilizado na prevenção da endocardite bacteriana; tratamento da amigdalite; otite média; sinusite; gonorreia; infecção urinária, odontogênica, da pele e no trato respiratório baixo. Também é indicado nas infecções por Chlamydia em grávidas, na doença de Lyme, gastrite por Helicobacter pylori; úlcera péptica por Helicobacter pylori.

AMOXICILINA, ÁCIDO CLAVULÂNICO

Trata-se de uma penicilina que atende um grande variedade de espécies gram-positivas e gram-negativas. A amoxicilina também é encontrada em associação ao ácido clavulânico, que é produzido por meio da fermentação do *Streptomyces clavuligerus*, sendo um inibidor de betalactamases, melhorando a eficácia da amoxicilina.

Indicação: em infecções urinárias, odontogênicas, de pele, ainda para amigdalite, sinusite e vaginite.

AZITROMICINA, DI-HIDRATADA

Antibacteriano pertencente à família dos macrolídeos.

Indicação: em casos de infecção do trato respiratório inferior, bronquite e pneumonia; em casos de infecção do trato respiratório superior, sinusite e faringite/tonsilite. No tratamento de infecções genitais não complicadas devido a *Chlamydia trachomatis* e a *Neisseria gonorrhoeae* (ausência de resistência múltipla). Indicado no tratamento de cancro em *Haemophilus ducreyi*.

CEFALEXINA, MONOHIDRATADA

Faz parte dos betalactâmicos, sendo uma cefalosporina de primeira geração. Tem a capacidade de impedir a síntese da parede celular bacteriana, agindo em um amplo espectro contra Gram positiva e Gram negativa, além de ter rápida absorção.

Indicação: em infecções trato geniturinário; óssea; de pele e tecido mole; orofacial por anaeróbicos e por cocos Gram-positivos; pneumonia; otite média; faringite; amigdalite.

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO

É um agente antibacteriano fluoroquinolônico sintético.

Indicação: tratamento de infecções complicadas e não complicadas ocasionadas por microrganismos sensíveis ao ciprofloxacino. - Infecções do trato genito-urinário. Trato respiratório: o cloridrato de ciprofloxacino Possível tratamento de escolha, no trato respiratório, em caso de pneumonias causadas por *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Proteus spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella catarrhalis*, *Legionella spp.* e *Staphylococcus*. Não deve ser considerado como primeira escolha em casos de pacientes ambulatoriais com pneumonia causada por *Pneumococcus*. Recomendado para tratamento da otite média e sinusite, principalmente se a infecção for causada por organismos gram-negativos, inclusive *Pseudomonas aeruginosa* ou *Staphylococcus*.

ESPIRAMICINA:

- para os casos de infecções por microrganismos sensíveis à espiramicina, como os que causam: manifestações otorrinolaringológicas, broncopulmonares, cutâneas, genitais (em particular prostáticas), ósseas e estomatológicas.
- em determinados casos, na profilaxia de meningite meningocócica.
- na quimioprofilaxia de recaída de Reumatismo Articular Agudo em pacientes alérgicos à penicilina.
- na toxoplasmose, em mulheres grávidas.

METRONIDAZOL

É um antimicrobiano e antiprotozoário. Possui boa atuação em várias doenças protozoárias e infecções bacterianas ao causar morte celular dessas, agindo sobre o DNA. Alcança sua absorção máxima entre 8 e 12 horas, com meia vida plasmática de aproximadamente 8 a 10 horas. O consumo de bebida alcoólica e metronidazol não é recomendado.

Indicação: em infecção oral causada por microrganismos anaeróbicos, tais como *Bacteroides*, *Clostridium* spp e alguns estreptococos; periodontite por *Actinobacillus actinomycetemcomitans*; tricomoníase; vaginite por *Gardnerella vaginalis*.

NEOMICINA + BACITRACINA

O sulfato de neomicina + bacitracina zínica é um medicamento formado pela associação de dois antibióticos de uso local, sem administração por via sistêmica.

Indicação: tratamento de infecções bacterianas da pele e de mucosas, causadas por microrganismos sensíveis: piodermites, impetigo, eczemas infectados, otite externa, infecções da mucosa nasal, furúnculos, antraz, ectima, abscessos, acne infectada, intertrigo, úlceras cutâneas e queimaduras infectadas. Na profilaxia de infecções cutâneo-mucosas provenientes de ferimentos cortantes (inclusive cirúrgicos), abrasões, queimaduras pouco extensas, dentre outros.

NITROFURANTOÍNA

É um agente antibacteriano, com atividade em diversos microrganismos Gram positivos e Gram negativos, porém demonstra uma menor irritação gastrointestinal na sua forma macrocristalina.

Indicação: limita-se ao tratamento de infecções do trato urinário.

SULFADIAZINA:

Atua por ação bacteriostática. É eficiente no tratamento das infecções gonocócicas, estafilocócicas, estreptocócicas e meningocócicas.

TETRACICLINA + ANFOTERICINA:

Este medicamento é indicado para o tratamento de infecções vaginais causadas por fungos e bactérias e após a cauterização do colo do útero, para prevenir infecções e acelerar a cicatrização.

5.4 ANTIFÚNGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CLOTRIMAZOL 10MG/G (1%), CREME VAGINAL, BISNAGA COM 35G + APLICADOR	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIFÚNGICO
2	FLUCONAZOL 150MG, CÁPSULA	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIFÚNGICO
3	ISOCONAZOL 10MG/G - CREME VAGINAL - 40G	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIFÚNGICO
4	ITRACONAZOL 100MG, COMPRIMIDOS	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIFÚNGICO
5	MICONAZOL, NITRATO DE, 2% (20MG/ML), CREME VAGINAL, BISNAGA 80G, C/ APLICADOR	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIFÚNGICO
6	NISTATINA 25.000UI/G (OU 100.000UI/4G), CREME VAGINAL, BISNAGA COM 60G + APLICADOR	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIFÚNGICO
7	TINIDAZOL, COMPRIMIDO 500MG	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIFÚNGICO
8	TIOCONAZOL 20MG/G (100MG/5G) + TINIDAZOL 30MG/G (150MG/5G) - CREME VAGINAL - BISNAGA COM 35G + APLICADOR	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER.	ANTIFÚNGICO

CLOTRIMAZOL

Indicação: tratamento de dermatomicoses causadas por dermatófitos, leveduras, bolores, etc. (por ex.: *Tinea pedis*, *Tinea manuum*, *Tinea corporis*, *Tinea inguinalis*, *Pityriasis versicolor*). Tratamento de infecções dos genitais externos e áreas adjacentes na mulher, assim como inflamação da glândula e prepúcio do parceiro sexual causada por leveduras (vulvite e balanite por *Candida*).

FLUCONAZOL

Indicação: tratamento de candidíase oral, vaginal; casos de - *Tinea corporis*; *Tinea cruris*; *Tinea pedis* (pé-de-atleta).

ISOCONAZOL

Tratamento de infecções superficiais na pele, provocadas por fungos, leveduras e mofos que causam micoses na pele.

ITRACONAZOL

Indicação: tratamento de candidíase oral, orofaríngea, vaginal; casos de - Tinea corporis; Tinea cruris; Tinea pedis (pé-de-atleta); Tinea manuum; Tinea versicolor (pitiríase versicolor).

MICONAZOL, NITRATO

Indicação: tratamento de candidíase oral, cutânea, vaginal; casos de - Tinea corporis; Tinea cruris; Tinea pedis (pé-de-atleta); Tinea versicolor (pitiríase versicolor).

NISTATINA

Indicação: tratamento de candidíase oral e vaginal.

TINIDAZOL: Tinidazol é um medicamento indicado para a prevenção de infecções após cirurgias causadas por bactérias anaeróbias (que não precisam de oxigênio para sobreviver) e para o tratamento de diversas infecções causadas por bactérias sensíveis ao tinidazol, tais como: Vaginite inespecífica (infecção da vagina causada por microrganismos, principalmente a Gardnerella vaginalis e micoplasmas); Tricomoniase urogenital masculina e feminina (doença sexualmente transmissível, causada pelo Trichomonas vaginalis que pode causar corrimento de cor verde-amarelada e odor desagradável); Giardíase (infecção intestinal causada pela Giardia lamblia, que pode levar a diarreia, dor abdominal, náuseas - enjoos e vômitos); amebíase intestinal (infecção intestinal causada pela Entamoeba histolytica que pode levar a diarreia) e amebíase extra intestinal (infecção causada pela Entamoeba histolytica em órgãos que não são o intestino), especialmente abscesso hepático (cavidade com pus em seu interior no fígado) amebiano; Infecções intraperitoneais (dentro do peritônio – o peritônio é uma membrana que recobre os órgãos dentro do abdome) como peritonite (infecção da membrana do peritônio) e abscessos (cavidades com pus no seu interior); Infecções ginecológicas como endometrite (infecção do endométrio – camada interna do útero), endometriometrite (infecção do endométrio e do miométrio – camada muscular na região intermediária da parede do útero), abscesso tuboovariano (cavidade com pus no seu interior na tuba uterina e no ovário); Septicemia bacteriana (infecção generalizada

causada por bactérias); Infecções de cicatrizes no pós-operatório; infecções da pele e tecidos moles (pele, músculos, tendões, ligamentos, gordura); Infecções do trato respiratório superior (parte do trato respiratório que vai do nariz até a traqueia, englobando garganta) e inferior (brônquios e pulmão), pneumonia, empiema (acúmulo de pus dentro de uma cavidade natural, por ex. empiema pleural – acúmulo de pus entre os pulmões e a parede do tórax); Abscesso pulmonar (cavidade com pus no seu interior nos pulmões).

TIOCONAZOL: é um medicamento de uso tópico (no local da lesão), que age como fungicida (medicamento que mata os fungos), causando o alívio da infecção na pele já nos primeiros dias de tratamento. Também possui atividade contra várias bactérias, incluindo *Staphylococcus* e *Streptococcus* spp. (bactérias que frequentemente podem infectar a pele já afetada por uma micose).

5.5 ANTIVIRAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ACICLOVIR 200MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
2	ACICLOVIR 50MG/G – POMADA – BISNAGA 10 G	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

ACICLOVIR

Indicação: tratamento de infecções causadas por *Herpes simplex* na pele e mucosas, incluindo herpes genital recente e de repetição. Em imunocompetentes, indica-se para suprimir casos recorrentes e em imunocomprometidos como medida profilática. Para o tratamento de infecções pelo *Herpes zoster*.

5.6 ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO

É um analgésico anti-inflamatório não esteroidal (AINE).

Indicação: febre; dor. Porém, seu uso clínico está mais relacionado a sua ação cardiovascular, uma vez que é capaz de diminuir a agregação plaquetária.

5.7 ANTIANÊMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANTIANÊMICOS
2	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO), 15 MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANTIANÊMICOS
3	SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR, COMPRIMIDO REVESTIDO.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANTIANÊMICOS

ÁCIDO FÓLICO

Indicação: para prevenção e tratamento de carência de ácido fólico. Uso em anemias hemolíticas e megaloblástica.

FOLINATO DE CÁLCIO

O folinato de cálcio é indicado como antídoto dos efeitos tóxicos dos antagonistas do ácido fólico, tais como metotrexato, primetamina ou trimetoprima; para prevenir a toxicidade severa devido à superdose de metotrexato e como parte dos programas de tratamento quimioterápico no cuidado de várias formas de câncer. O folinato de cálcio também é indicado para o tratamento das anemias megaloblásticas por deficiência de folatos, quando a terapia oral não é adequada.

SULFATO FERROSO

Antianêmico que atua na reposição de ferro, auxiliando na prevenção e tratamento de anemias por deficiência de ferro.

Indicação: em anemias ferroprivas da gravidez e da lactação; anemias consequentes de hemorragias agudas .

5.8 ANTIESPASMÓDICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANTIESPASMÓDICOS

ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO

Indicação: úlcera estomacal e duodenal; cólica.

5.9 ANTIEMÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BROMOPRIDA 10 MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANTIEMÉTICO

BROMOPRIDA

É um antiemético.

Indicação: distúrbios da motilidade gastrintestinal; refluxo gastroesofágico; náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de medicamentos).

5.10 ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G, CREME, BISPAGA 10 G.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	CORTICOSTEROIDES

DEXAMETASONA, ACETATO.

Indicação: utilizado como anti- inflamatório e imunossupressor, principalmente para tratamento intensivo, realizados em períodos mais curtos.

5.11 ANTIFISÉTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	Simeticona 40mg, comprimido.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANTIFISÉTICO

SIMETICONE

A simeticona é indicada para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, que causa desconforto abdominal, aumento do volume abdominal, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases alivia estes sintomas. A simeticona também pode ser usada como medicação auxiliar no preparo dos pacientes em exames médicos, tais como endoscopia digestiva (exame do interior do esôfago, estômago e intestino) e/ ou colonoscopia (exame do interior do intestino grosso).

5.12 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DIPIRONA SÓDICA 500 MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
2	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

DIPIRONA SÓDICA

Indicação: age minimizando febre e dores.

PARACETAMOL

Indicação: age minimizando febre e dores.

5.13 ANTIDEPRESSIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, CÁPSULA.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANTIDEPRESSIVOS

FLUOXETINA, CLORIDRATO

Indicação: tratamento da depressão; distúrbio bipolar; bulimia nervosa.

5.14 ANTI-HIPERTENSIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
2	NIFEDIPINA 20MG, COMPRIMIDO LIBERAÇÃO RETARDADA	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANTI-HIPERTENSIVO

METILDOPA

Indicação: tratamento de hipertensão (leve, moderada ou grave).

NIFEDIPINA

Indicação: tratamento de hipertensão arterial; tratamento de doença arterial coronária. Angina do peito crônica estável (angina de esforço).

5.15 ANTISSECRETORES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULA.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANTISSECRETORES

OMEPRAZOL

Indicação: úlceras pépticas benignas, gástricas ou duodenais. Em casos de hiperacidez gástrica, prevenindo que úlceras gástricas ou duodenais reapareçam na síndrome de Zollinger-Ellison. Faz parte do esquema para supressão do *Helicobacter pylori*, protege a mucosa gástrica contra prejuízos possíveis de serem ocasionados por anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e também protege na esofagite de refluxo, em crianças com mais de um ano de idade.

5.16 VITAMINAS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	POLIVITAMÍNICO, CONTENDO NO MÍNIMO: VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B6 + VITAMINA B12 + NICOTINAMIDA + VITAMINA B5 + ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) + VITAMINA E + ZINCO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	SUPLEMENTOS MINERAIS
2	VITAMINA DO COMPLEXO B (B15MG + B2 2MG + B3 20MG+ B5 3MG +B6 2MG)	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	SUPLEMENTOS MINERAIS

POLIVITAMÍNICO

Indicação: para suprir os estados de deficiência de diversos elementos, algumas vezes associados ao estresse oxidativo.

COMPLEXO B

É indicado para o tratamento de carência múltipla de vitaminas do complexo B e suas manifestações. Tem ação reguladora das carências quando já existem manifestações clínicas causadas pela deficiência vitamínica.

5.17 ANTICOAGULANTE

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	HEPARINA SÓDICA SC 5000UI/0,25ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 0,25ML	DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER	ANTICOAGULANTE

HEPARINA SÓDICA

A Heparina sódica é dispensada no Departamento de Saúde da Mulher apenas para mulheres grávidas.

Indicação: prevenção de fenômenos tromboembólicos.

6. CLASSE TERAPÊUTICA/ GRUPO FARMACOLÓGICO – MEDICAÇÕES DISPENSADAS EXCLUSIVAMENTE NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

As medicações dispensadas no Departamento de Saúde da Criança e Adolescente são para pacientes que passaram por consultas no departamento.

6.1 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DIPIRONA SÓDICA 500 MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
2	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 10 ML.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
3	PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 15 ML.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
4	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

DIPIRONA SÓDICA

Indicação: age minimizando febre e dores.

PARACETAMOL

Indicação: age minimizando febre e dores.

6.2 ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO

É um analgésico anti-inflamatório não esteroidal (AINE).

Indicação: febre; dor. Porém, seu uso clínico está mais relacionado a sua ação cardiovascular, uma vez que é capaz de diminuir a agregação plaquetária.

6.3 ANTI-HISTAMÍNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTI-HISTAMÍNICOS
2	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTI-HISTAMÍNICOS
3	LORATADINA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTI-HISTAMÍNICOS
4	LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTI-HISTAMÍNICOS

DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO

Trata-se de um anti-histamínico.

Indicação: para alergia, urticária, dermatite e rinite alérgica.

LORATADINA

Trata-se de um anti-histamínico.

Indicação: alívio de sintomas gerados na rinite alérgica e na urticária idiopática crônica.

6.4 ANTIANÊMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTIANÊMICOS
2	SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG FERRO/ML), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTIANÊMICOS
3	SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR, COMPRIMIDO REVESTIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTIANÊMICOS

ÁCIDO FÓLICO

Indicação: para prevenção e tratamento de carência de ácido fólico. Uso em anemias hemolíticas e megaloblástica.

SULFATO FERROSO

Antianêmico que atua na reposição de ferro, auxiliando na prevenção e tratamento de anemias por deficiência de ferro.

Indicação: em anemias ferroprivas da gravidez e da lactação; anemias consequentes de hemorragias agudas .

6.5 ANTIASMÁTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG/JATO, AEROSSOL ORAL, FRASCO, 200 DOSES	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	CORTICOSTERÓIDES
2	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/JATO, SPRAY NASAL, FRASCO 200 DOSES.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	CORTICOSTERÓIDES
3	FENOTEROL 5 MG/ML, SOLUÇÃO, FRASCO GOTEJADOR	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTIARRÍTMICOS
4	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTICOLINÉRGICOS
5	SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (XAROPE) - FRASCO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	BRONCODILADORES
6	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/JATO, AEROSSOL, FRASCO 200 DOSES.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	BRONCODILADORES

BECLOMETASONA, DIPROPIONATO

É um corticosteróide capaz de atuar como anti- inflamatório no trato respiratório e antiasmático.

Indicação: em casos de asma brônquica, no tratamento e prevenção; na rinite alérgica; espasmo brônquico; sinusites; rinite vasomotora; em doenças inflamatórias que afetam os seios nasais e paranasais e a faringe, e também, para prevenir formações carnosas da membrana mucosa nasal que podem reaparecer após retirada cirúrgica.

FENOTEROL, BROMIDRATO

É um broncodilatador que ao estimular os receptores beta adrenérgicos, no pulmão, fazem com que o músculo liso dos brônquios relaxem.

Indicação: em broncoespasmos associados a asma, tanto em crises agudas e brônquicas, quanto na prevenção de asma ocasionadas por atividades físicas. Também, trata e previne broncoespasmos causados por bronquite crônica, enfisema pulmonar e doença pulmonar obstrutiva crônica.

BROMETO DE IPRATRÓPIO

Sua ação ocorre no pulmão, na musculatura lisa dos brônquios ao antagonizar a acetilcolina e



dilatar os brônquios.

Indicação: para tratar broncoespasmo relacionado a bronquite crônica, enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, além da asma, em ação conjunta com outros broncodilatadores.

SALBUTAMOL, SULFATO

É um broncodilatador com baixa durabilidade em quadros de obstrução reversível das vias aéreas, na asma, bronquite crônica e enfisema. Não sendo a principal escolha para tratar casos graves e pouco estáveis. Tem a capacidade de relaxar o músculo liso dos brônquios levando a uma broncodilatação ao causar estímulo nos receptores beta 2 nos pulmões.

Indicação: prevenir e tratar broncoespasmo em caso de bronquite crônica; enfisema pulmonar; doença pulmonar obstrutiva crônica e em casos de broncoespasmo relacionado a esforço físico, atuar na prevenção.

6.6 ANTIBACTERIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	PENICILINAS
2	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	PENICILINAS
3	AMOXICILINA 50MG/ML (250MG/5ML), PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60ML, COM DOSADOR GRADUADO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	PENICILINAS
4	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5G/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 75ML	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	PENICILINAS
5	AMPICILINA 500MG, COMPRIMIDO OU CÁPSULA	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	PENICILINAS
6	AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG POR FRASCO), PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	MACROLÍDEOS
7	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	MACROLÍDEOS
8	CEFALEXINA 500MG, COMPRIMIDO OU CÁPSULA EM BLISTER	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	CEFALOSPORINAS
9	CEFALEXINA 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 100ML	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	CEFALOSPORINAS
10	CIPROFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	QUINOLONAS
11	CLARITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	MACROLÍDEOS
12	DOXICICLINA 100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	TETRACICLINAS
13	METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTIBACTERIANOS/ ANTIPROTOZOÁRIO
14	METRONIDAZOL 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTIBACTERIANOS/ ANTIPROTOZOÁRIO
15	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G, POMADA, BISNAGA COM 10G.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTIBACTERIANOS DE USO USO TÓPICO
16	NITROFURANTOÍNA 100 MG, CÁPSULA GELATINOSA.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	OUTROS ANTIBACTERIANOS

17	SULFAMETAXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG, COMPRIMIDO	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	OUTROS ANTIBACTERIANOS
18	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETROPINA 8MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 50ML	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	OUTROS ANTIBACTERIANOS
19	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO CONTA GOTAS COM 5ML	FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DAS UBS, FARMÁCIA CENTRAL E FARMÁCIA OESTE.	OUTROS ANTIBACTERIANOS

AMOXICILINA

É uma penicilina usada como antibacteriano que atende uma grande variedade de espécies gram-positivas e gram-negativas.

Indicação: é utilizado na prevenção da endocardite bacteriana; tratamento da amigdalite; otite média; sinusite; gonorreia; infecção urinária, odontogênica, da pele e no trato respiratório baixo. Também é indicado nas infecções por Chlamydia em grávidas, na doença de Lyme, gastrite por Helicobacter pylori; úlcera péptica por Helicobacter pylori.

AMOXICILINA, ÁCIDO CLAVULÂNICO

Trata-se de uma penicilina que atende um grande variedade de espécies gram-positivas e gram-negativas. A amoxicilina também é encontrada em associação ao ácido clavulânico, que é produzido por meio da fermentação do *Streptomyces clavuligerus*, sendo um inibidor de betalactamases, melhorando a eficácia da amoxicilina.

Indicação: em infecções urinárias, odontogênicas, de pele, ainda para amigdalite, sinusite e vaginite.

AMPICILINA

A ampicilina pó para suspensão é indicada no tratamento de infecções do trato respiratório, urinário, digestivo e biliar. Infecções causadas por Haemophilus, Proteus e E. coli. Também é utilizada em infecções da boca, em extrações infectadas e em procedimentos cirúrgicos.

AZITROMICINA, DI-HIDRATADA

Antibacteriano pertencente à família dos macrolídeos.

Indicação: em casos de infecção do trato respiratório inferior, bronquite e pneumonia; em casos de infecção do trato respiratório superior, sinusite e faringite/tonsilite. No tratamento de infecções

genitais não complicadas devido a *Chlamydia trachomatis* e a *Neisseria gonorrhoeae* (ausência de resistência múltipla). Indicado no tratamento de cancro em *Haemophilus ducreyi*.

CEFALEXINA, MONOHIDRATADA

Faz parte dos betalactâmicos, sendo uma cefalosporina de primeira geração. Tem a capacidade de impedir a síntese da parede celular bacteriana, agindo em um amplo espectro contra Gram positiva e Gram negativa, além de ter rápida absorção.

Indicação: em infecções trato geniturinário; óssea; de pele e tecido mole; orofacial por anaeróbicos e por cocos Gram-positivos; pneumonia; otite média; faringite; amigdalite.

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO

É um agente antibacteriano fluoroquinolônico sintético.

Indicação: tratamento de infecções complicadas e não complicadas ocasionadas por microrganismos sensíveis ao ciprofloxacino. - Infecções do trato genito-urinário. Trato respiratório: o cloridrato de ciprofloxacino Possível tratamento de escolha, no trato respiratório, em caso de pneumonias causadas por *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Proteus spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella catarrhalis*, *Legionella spp.* e *Staphylococcus*. Não deve ser considerado como primeira escolha em casos de pacientes ambulatoriais com pneumonia causada por *Pneumococcus*. Recomendado para tratamento da otite média e sinusite, principalmente se a infecção for causada por organismos gram-negativos, inclusive *Pseudomonas aeruginosa* ou *Staphylococcus*.

CLARITROMICINA

Trata-se de um antibacteriano, da família dos macrolídeos.

Indicação: na faringite; amigdalite; pneumonia; sinusite; na infecção orofacial causada por anaeróbicos ou por cocos Gram positivos; em infecções das vias aéreas superiores e inferiores, além de infecções da pele e tecidos moles, ocasionados por microrganismos sensíveis à claritromicina. Também é indicada no tratamento de infecções provocadas por *Mycobacterium avium* ou *Mycobacterium intracellulare* (disseminadas ou localizadas) e *Mycobacterium chelonae*, *Mycobacterium fortuitum* ou *Mycobacterium kansasii* (localizadas).

CLORIDRATO DE DOXICICLINA

Antibacteriano, pertence ao grupo das tetraciclinas.

Indicação: indicado para o tratamento de diversas infecções, ocasionadas por agentes sensíveis à doxiciclina. Tratamento da cólera, gengivite ulcerativa aguda com necrose (infecção de Vincent); periodontite (*Actinobacillus actinomycetemcomitans*); prevenção e tratamento da malária; tratamento da febre maculosa. Uso em casos que a penicilina é contra- indicada. Auxilia no tratamento da infecção aguda por amebas no intestino e no tratamento da acne.

METRONIDAZOL

É um antimicrobiano e antiprotozoário. Possui boa atuação em várias doenças protozoárias e infecções bacterianas ao causar morte celular dessas, agindo sobre o DNA. Alcança sua absorção máxima entre 8 e 12 horas, com meia vida plasmática de aproximadamente 8 a 10 horas. O consumo de bebida alcoólica e metronidazol não é recomendado.

Indicação: em infecção oral causada por microrganismos anaeróbicos, tais como *Bacteroides*, *Clostridium* spp e alguns estreptococos; periodontite por *Actinobacillus actinomycetemcomitans*; tricomoníase; vaginite por *Gardnerella vaginalis*.

NEOMICINA + BACITRACINA

O sulfato de neomicina + bacitracina zínica é um medicamento formado pela associação de dois antibióticos de uso local, sem administração por via sistêmica.

Indicação: tratamento de infecções bacterianas da pele e de mucosas, causadas por microorganismos sensíveis: piodermites, impetigo, eczemas infectados, otite externa, infecções da mucosa nasal, furúnculos, antraz, ectima, abscessos, acne infectada, intertrigo, úlceras cutâneas e queimaduras infectadas. Na profilaxia de infecções cutâneo-mucosas provenientes de ferimentos cortantes (inclusive cirúrgicos), abrasões, queimaduras pouco extensas, dentre outros.

NITROFURANTOÍNA

É um agente antibacteriano, com atividade em diversos microrganismos Gram positivos e Gram negativos. É capaz de causar danos ao DNA bacteriano, modificando ou inativando suas proteínas. Sua absorção é feita rapidamente na forma microcristalina, porém demonstra uma menor irritação gastrointestinal na sua forma macrocristalina.

Indicação: limita-se ao tratamento de infecções do trato urinário.

SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA

Indicação: em casos de infecção gênito-urinária, renal, respiratória, bronquite crônica, na otite média, em alguns casos de pneumonia. Além de uso na toxoplasmose.

TOBRAMICINA

Antibacteriano, pertencente a classe dos aminoglicosídeos. Estudos realizados in vitro, indicaram que a tobramicina é ativa contra cepas sensíveis dos seguintes microrganismos: Staphylococci, inclusive *S. aureus* e *S. epidermidis* (coagulase positivos e coagulase negativos), incluindo cepas resistentes à penicilina. Streptococci, além de algumas espécies do grupo A beta-hemolítico, algumas espécies não hemolíticas e algumas cepas de *Streptococcus pneumoniae*. *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter aerogenes*, *Proteus mirabilis*, *Morganella morganii*, maioria das cepas de *Proteus vulgaris*, *Haemophilus influenzae* e *H. aegyptius*, *Moraxella lacunata*, *Acinetobacter calcoaceticus* e algumas espécies de *Neisseria*. Os estudos de sensibilidade bacteriana indicaram que muitos microrganismos resistentes à gentamicina mantêm a sensibilidade à tobramicina.

Indicação: tratamento de infecções externas dos olhos e seus anexos, causadas por bactérias sensíveis à tobramicina.

6.7 ANTICONVULSIVANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG, CÁPSULA OU COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTICONVULSIVANTES
2	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML, COM DOSADOR GRADUADO, FRASCO C/ 100ML, XAROPE	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTICONVULSIVANTES
3	CARBAMAZEPINA 200MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTICONVULSIVANTES
4	CARBAMAZEPINA 100MG/5ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 100ML	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTICONVULSIVANTES
5	FENITOÍNA 100MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTICONVULSIVANTES
6	FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTICONVULSIVANTES
7	FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTICONVULSIVANTES

ÁCIDO VALPRÓICO

Indicação: casos de epilepsia, uso como monoterápico ou terapia adjuvante ao tratamento de pacientes com crises parciais complexas. Epilepsia, em quadros de ausência simples e complexa em pacientes adultos e crianças acima de 10 anos, além de terapia auxiliar em adultos e crianças acima de 10 anos com crises de múltiplos tipos, incluindo crises de ausência.

CARBAMAZEPINA

A carbamazepina é usada no tratamento de determinados tipos de crises convulsivas (epilepsias). É também usado no tratamento de algumas doenças neurológicas (como por exemplo, uma condição dolorosa da face chamada neuralgia do trigêmeo), tão bem quanto em determinadas condições psiquiátricas (tais como as conhecidas como episódios de mania de distúrbios do humor bipolar e um certo tipo de depressão). Não deve ser usado em dores comuns.



FENITOÍNA

Indicação: em casos de epilepsia, exceto crises de ausência; convulsões, neuralgia do trigêmeo.

FENOBARBITAL

É um anticonvulsivante, sedativo, pertencente a classe dos barbitúricos, sendo um dos primeiros a ser desenvolvido. Tem atuação sobre a intensidade e duração das crises, caracterizado por ser um depressor do sistema nervoso central.

Indicação: epilepsia; na convulsão febril em crianças; na hiperbilirrubinemia do recém-nascido.

6.8 ANTIDEPRESSIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ANTIDEPRESSIVOS
2	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, CÁPSULA.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIDEPRESSIVOS
3	IMIPRAMINA, CLORIDRATO DE, 25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIDEPRESSIVOS

AMITRIPTILINA, CLORIDRATO

É um antidepressivo tricíclico largamente indicado. Potencializa as concentrações de serotonina e norepinefrina nas sinapses no sistema nervoso central (SNC); numa análise mais prolongada apresenta aumento da resposta dada a estímulos adrenérgicos e serotoninérgicos. Sua absorção ocorre de forma rápida e eficaz. Tem ação iniciada entre a segunda e terceira semana de uso.

Indicação: depressão; bulimia; alívio da dor neuropática, em alguns casos.

FLUOXETINA, CLORIDRATO

Indicação: tratamento da depressão; distúrbio bipolar; bulimia nervosa.

IMIPRAMINA

Pertence ao grupo de medicamentos conhecidos como antidepressivos tricíclicos, que são usados para tratar depressão e distúrbios do humor. Estados de pânico, dores crônicas e incontinência urinária noturna em crianças acima de 5 anos de idade são outras condições psicológicas que podem ser tratadas com Imipramina.

6.9 ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BROMOPRIDA 10 MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIEMÉTICO
2	BROMOPRIDA 4MG/ML – SOLUÇÃO ORAL- FRASCO COM 20 ML	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIEMÉTICO
3	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	AGENTES PROCINÉTICOS

BROMOPRIDA

É um antiemético.

Indicação: distúrbios da motilidade gastrintestinal; refluxo gastroesofágico; náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de medicamentos).

METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO

Trata-se de um antiemético, capaz de aumentar a motilidade do esôfago, do estômago e do intestino, assim, sua ação agiliza o esvaziamento do estômago e estimula o trânsito intestinal.

Indicação: vômito; náusea; refluxo gastro-esofágico; vômitos provocados por uremia, radiação, distúrbios gastrointestinais, citotóxicos.

6.10 ANTIFÚNGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CETOCONAZOL 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIFÚNGICO
2	CLOTRIMAZOL 10 MG/G (1%), CREME VAGINAL, BISNAGA COM 35 G + APLICADOR	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIFÚNGICO
3	FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIFÚNGICO
4	ISOCONAZOL 10MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA COM 40G + APLICADOR	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIFÚNGICO
5	ITRACONAZOL 100 MG, CÁPSULA.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIFÚNGICO
6	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80 G + APLICADOR.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIFÚNGICO
7	NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIFÚNGICO
8	NISTATINA 25.000UI/G (OU 100.000UI/4G), CREME VAGINAL, BISNAGA COM 60G +	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIFÚNGICO
9	NISTATINA 100.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G - POMADA DERMATOLOGICA - BISNAGA COM 60G	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIFÚNGICO

CETOCONAZOL

Indicação: tratamento de candidíase oral, vaginal, disseminada; dermatite seborréica; casos graves de - Tinea corporis; Tinea cruris; Tinea pedis (pé-de-atleta); Tinea versicolor (pitiríase versicolor).

CLOTRIMAZOL

Indicação: tratamento de dermatomicoses causadas por dermatófitos, leveduras, bolores, etc. (por ex.: *Tinea pedis*, *Tinea manuum*, *Tinea corporis*, *Tinea inguinalis*, *Pityriasis versicolor*). Tratamento de infecções dos genitais externos e áreas adjacentes na mulher, assim como inflamação da glândula e prepúcio do parceiro sexual causada por leveduras (vulvite e balanite por *Candida*).

FLUCONAZOL

Indicação: tratamento de candidíase oral, vaginal; casos de - Tinea corporis; Tinea cruris; Tinea pedis (pé-de-atleta).

ITRACONAZOL

Indicação: tratamento de candidíase oral, orofaríngea, vaginal; casos de - Tinea corporis; Tinea cruris; Tinea pedis (pé-de-atleta); Tinea manuum; Tinea versicolor (pitiríase versicolor).

MICONAZOL, NITRATO

Indicação: tratamento de candidíase oral, cutânea, vaginal; casos de - Tinea corporis; Tinea cruris; Tinea pedis (pé-de-atleta); Tinea versicolor (pitiríase versicolor).

NISTATINA

Indicação: tratamento de candidíase oral e vaginal.

6.11 ANTI-HIPERTENSIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA
2	FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	DIURÉTICOS DE ALÇA
3	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG, DRÁGEA	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	VASODILATADORES DIRETOS
4	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	DIURÉTICOS TIAZÍDICOS
5	METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS
6	NIFEDIPINA 20MG, COMPRIMIDO LIBERAÇÃO RETARDADA	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTI-HIPERTENSIVO

CAPTOPRIL

Indicação: no tratamento da hipertensão; na insuficiência cardíaca juntamente com diuréticos e digitálicos; infarto do miocárdio, como terapia pós infarto e também na nefropatia diabética.

FUROSEMIDA

Indicação: na hipertensão arterial, em conjunto com outros anti-hipertensivos; edema agudo de pulmão; insuficiência cardíaca crônica; cirrose hepática complicada por ascite; síndrome nefrótica; insuficiência renal.

HIDRALAZINA, CLORIDRATO

Indicação: insuficiência cardíaca congestiva; pré-eclâmpsia ou eclâmpsia; hipertensão arterial.

HIDROCLOROTIAZIDA

Indicação: hipertensão arterial; edemas associados a insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática e a terapia realizada por corticosteróides ou estrógenos.



METILDOPA

Indicação: tratamento de hipertensão (leve, moderada ou grave).

NIFEDIPINA

Indicação: tratamento de hipertensão arterial; tratamento de doença arterial coronária. Angina do peito crônica estável (angina de esforço).

6.12 ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DESONIDA 0,5MG/G, CREME OU POMADA BISNAGA COM 30G	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	CORTICOSTEROIDES
2	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G, CREME, BISNAGA 10 G.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	CORTICOSTEROIDES
3	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 60ML+ MEDIDOR.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	CORTICOSTEROIDES
4	PREDNISONA 20 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	CORTICOSTEROIDES

DESONIDA

Este medicamento é destinado ao tratamento das lesões de pele sensíveis aos corticosteroides, atuando como anti-inflamatório e antipruriginoso (contra coceira). O tipo e o local da lesão a ser tratada devem ser considerados ao escolher a forma farmacêutica mais adequada: o creme dermatológico destina-se ao tratamento de lesões agudas situadas em áreas úmidas.

DEXAMETASONA, ACETATO.

Indicação: utilizado como anti- inflamatório e imunossupressor, principalmente para tratamento intensivo, realizados em períodos mais curtos.

PREDNISOLONA

Indicação: tratamento de condições endócrinas, e como terapia de algumas neoplasias. Indicado como agente anti-inflamatório e imunossupressor em distúrbios com mecanismos fisiopatológicos que possuam processos inflamatórios e/ou autoimunes.

PREDNISONA

Indicação: tratamento de diversas doenças que geram inflamação grave-endócrinas, osteomusculares, reumáticas, do colágeno, dermatológicas, alérgicas, oftálmicas, respiratórias, hematológicas, neoplásicas.

6.13 ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL
2	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL
3	IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS, FRASCO 30ML.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL
4	IBUPROFENO 600 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL
5	NIMESULIDA 100MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL

DICLOFENACO, POTÁSSICO

Indicação: estados dolorosos inflamatórios pós-traumáticos como, por exemplo, os causados por entorses; uso na dor e inflamação no pós-operatório como, exemplo, após cirurgias ortopédicas ou odontológicas; em condições dolorosas e, ou inflamatórias em ginecologia como a menstruação dolorosa primária ou inflamação dos anexos uterinos; síndromes dolorosas da coluna vertebral; reumatismo não articular; como auxiliar no tratamento de processos infecciosos graves acompanhados de dor e inflamação em ouvido, nariz ou garganta.

DICLOFENACO DE SÓDIO

Indicação: no tratamento de formas degenerativas e inflamatórias de reumatismo: artrite reumatóide; espondilite anquilosante; osteoartrite e espondilartrite; síndromes dolorosas da coluna vertebral; reumatismo não articular; crises agudas de gota; inflamações pós-traumáticas e pós-operatórias dolorosas e edema, como por exemplo, após cirurgia dentária ou ortopédica; condições inflamatórias e/ou dolorosas em ginecologia, como por exemplo, dismenorreia primária ou anexite; auxilia no tratamento de processos infecciosos acompanhados de dor e inflamação de ouvido, nariz ou garganta, como por exemplo, faringoamigdalites, otites.



IBUPROFENO

Indicação: tratamento da artrite reumatoide, osteoartrite, reumatismo articular, traumas no sistema musculoesquelético, amenizando os sinais e sintomas em decorrência de componentes inflamatórios e dolorosos que possam estar presentes. Alívio da dor após procedimentos cirúrgicos.

6.14 ANTIPARASITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIPROTOZOÁRIOS
2	IVERMECTINA 6 MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTI-HELMÍNTICOS
3	MEBENDAZOL 20MG/ML, (100MG/5ML) SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIPARASITÁRIO

ALBENDAZOL

Indicação: tratamento de infecções parasitárias ocasionadas por *Ascaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis*, *Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale*, *Trichuris trichiura*, *Strongyloides stercoralis*, *Taenia spp.* e *Hymenolepis nana*. Também é utilizado para a opistorquíase (*Opisthorchis viverrini*) e a larva migrans cutânea, além de giardíase (*Giardia lamblia*, *G. duodenalis*, *G. intestinalis*) infantil.

IVERMECTINA

Indicação: estrogiloidíase intestinal (infecção por *Strongyloides stercoralis*); oncocercose (infecção por *Onchocerca volvulus*); filariose (infecção por *Wuchereria bancrofti*); escabiose, sarna (infecção por *Sarcoptes scabiei*); pediculose (*Pediculus capitis*).

MEBENDAZOL

Indicação: uso como anti-helmíntico polivalente, com a finalidade de tratar infestações isoladas ou mistas, causadas por *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Enterobius vermicularis*, *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*, *Taenia solium* e *Taenia saginata*.

6.15 ANTISSECRETORES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULA.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTISSECRETORES

OMEPRAZOL

Indicação: úlceras pépticas benignas, gástricas ou duodenais. Em casos de hiperacidez gástrica, prevenindo que úlceras gástricas ou duodenais reapareçam na síndrome de Zollinger-Ellison. Faz parte do esquema para supressão do *Helicobacter pylori*, protege a mucosa gástrica contra prejuízos possíveis de serem ocasionados por anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e também protege na esofagite de refluxo, em crianças com mais de um ano de idade.

6.16 ANTIVIRAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ACICLOVIR 200MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
2	ACICLOVIR 50MG/G – POMADA – BISNAGA 10 G	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

ACICLOVIR

Indicação: tratamento de infecções causadas por *Herpes simplex* na pele e mucosas, incluindo herpes genital recente e de repetição. Em imunocompetentes, indica-se para suprimir casos recorrentes e em imunocomprometidos como medida profilática. Para o tratamento de infecções pelo *Herpes zoster*.

6.17 ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	PERMETRINA 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO 60 ML.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ESCABICIDAS E PEDICULICIDAS

PERMETRINA

Indicação: tratamento de pediculose do couro cabeludo (piolho); escabiose (sarna).

6.18 HORMÔNIOS SEXUAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG/ML + VALERATO ESTRADIOL 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	C ONTRACEPTIVOS
2	ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG – CARTELA 21 COMPRIMIDOS	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	CONTRACEPTIVOS
3	LEVONORGESTREL 1,5 MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	CONTRACEPTIVOS
4	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 1ML	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	CONTRACEPTIVOS
5	NORETISTERONA 0,35 MG - CARTELA COM 35 CPD	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	CONTRACEPTIVOS

ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL

Indicação: prevenção da gravidez e controle de irregularidades menstruais.

ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL

Indicação: prevenção da gravidez e controle de irregularidades menstruais.

LEVONORGESTREL

Indicação: prevenção de gravidez, após uma relação sexual sem proteção por método contraceptivo, ou se há suspeita de falha do método anticoncepcional usado.

MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO

Indicação: prevenção da gravidez e controle de irregularidades menstruais.

NORETISTERONA

Indicação: prevenção da gravidez e controle de irregularidades menstruais, tais como tratamento das hemorragias uterinas disfuncionais, dismenorrea, tensão pré-menstrual, algias pélvicas, mastodínia, distúrbios da fertilidade por insuficiência progestínica.

6.19 HORMÔNIOS TIREOIDIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	HORMÔNIOS TIREOIDIANOS

LEVOTIROXINA

Indicação: hipotireoidismo; bócio; câncer de tireóide.

6.20 INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	METFORMINA 850MG, COMPRIMIDO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	HIPOGLICEMIANTES

METFORMINA

Indicação: diabetes mellitus tipo 2 - não dependente de insulina. Tratamento associado ao regime alimentar e indicado para uso isolado ou em conjunto com outros antidiabéticos, tais como as sulfonilureias. Na diabetes mellitus tipo 1, dependente de insulina, somado a insulino-terapia, em situações de diabetes não controlada ou insulino-resistente. Em pacientes com sobrepeso e pré-diabéticos, recomendado como prevenção de diabetes mellitus tipo 2. Também, indicado na Síndrome dos Ovários Policísticos (Síndrome de Stein-Leventhal).

6.21 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA OCULAR

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	Timolol 0,5% - solução oftálmica - frasco com 5mL	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	AGENTES BETABLOQUEADORES

TIMOLOL, MALEATO

Indicação: tratamento da pressão intraocular elevada. Demonstrou em estudos clínicos, redução da pressão intraocular em pacientes com hipertensão ocular; com glaucoma crônico de ângulo aberto; em alguns pacientes com glaucoma secundário; pacientes com ângulos estreitos e histórico de fechamento de ângulo estreito espontâneo ou induzido iatrogenicamente no olho contralateral, em que se é necessário diminuir a pressão intraocular. Indicado como terapia adjunta, quando outra terapia antiglaucomatosa é ineficaz em pacientes com glaucoma pediátrico.

6.22 SUBSTÂNCIAS MINERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FÓRMULA DA OMS), PÓ, ENVELOPE 27,9 G.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	SUPLEMENTOS MINERAIS

SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL

Indicação: prevenção da desidratação e manutenção da hidratação após a fase de reidratação em quadros de doença diarreica aguda.

6.23 VITAMINAS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	POLIVITAMÍNICO SOLUÇÃO ORAL, CONTENDO NO MÍNIMO VIT. A + VIT. B1+ VIT. B2 + VIT. B5 + VIT. B6 + VIT. B8 + VIT. C+ VIT. D+ VIT. E, FRASCO COM 20ML	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	SUPLEMENTOS MINERAIS
2	POLIVITAMÍNICO, CONTENDO NO MÍNIMO: VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B6 + VITAMINA B12 + NICOTINAMIDA + VITAMINA B5 + ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) + VITAMINA E + ZINCO	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	SUPLEMENTOS MINERAIS
3	VITAMINA DO COMPLEXO B (B15MG + B2 2MG + B3 20MG+ B5 3MG +B6 2MG)	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	SUPLEMENTOS MINERAIS

POLIVITAMÍNICO

Indicação: para suprir os estados de deficiência de diversos elementos, algumas vezes associados ao estresse oxidativo.

COMPLEXO B

É indicado para o tratamento de carência múltipla de vitaminas do complexo B e suas manifestações. Tem ação reguladora das carências quando já existem manifestações clínicas causadas pela deficiência vitamínica.

6.24 ANTIFISÉTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	SIMETICONA 40MG, COMPRIMIDO.	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIFISÉTICO
2	SIMETICONA 75MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML	DEPARTAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	ANTIFISÉTICO

SIMETICONE

A simeticona é indicada para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, que causa desconforto abdominal, aumento do volume abdominal, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases alivia estes sintomas. A simeticona também pode ser usada como medicação auxiliar no preparo dos pacientes em exames médicos, tais como endoscopia digestiva (exame do interior do esôfago, estômago e intestino) e/ ou colonoscopia (exame do interior do intestino grosso).

7. CLASSE TERAPÊUTICA/ GRUPO FARMACOLÓGICO – MEDICAÇÕES DISPENSADAS EXCLUSIVAMENTE NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) – DST- AIDS

O SAE é uma unidade ambulatorial voltada a atenção integral às pessoas com HIV/AIDS, Hepatites Virais, Tuberculose e Hanseníase. As medicações dispensadas no SAE são para pacientes que passaram por consultas no departamento.

7.1 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DIPIRONA SÓDICA 500 MG, COMPRIMIDO	SAE - DST-AIDS	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
2	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 10 ML.	SAE - DST-AIDS	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
3	PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 15 ML.	SAE - DST-AIDS	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS
4	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	SAE - DST-AIDS	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

DIPIRONA SÓDICA

Indicação: age minimizando febre e dores.

PARACETAMOL

Indicação: age minimizando febre e dores.

7.2 ANTI-HISTAMÍNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG, COMPRIMIDO	SAE - DST-AIDS	ANTI-HISTAMÍNICOS
2	DEXCLORFENIRAMINA, 0,4MG/ML, XAROPE, FRASCO C/ 100ML	SAE - DST-AIDS	ANTI-HISTAMÍNICOS
3	LORATADINA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML.	SAE - DST-AIDS	ANTI-HISTAMÍNICOS
4	LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO.	SAE - DST-AIDS	ANTI-HISTAMÍNICOS

DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO

Trata-se de um anti-histamínico.

Indicação: para alergia, urticária, dermatite e rinite alérgica.

LORATADINA

Trata-se de um anti-histamínico.

Indicação: alívio de sintomas gerados na rinite alérgica e na urticária idiopática crônica.

7.3 ANTIANÊMICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	FOLINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO FOLÍNICO) 15 MG, COMPRIMIDO	SAE - DST-AIDS	ANTIANÊMICOS
2	SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG FERRO/ML), SOLUÇÃO ORAL, FRASCO	SAE - DST-AIDS	ANTIANÊMICOS

FOLINATO DE CÁLCIO

O folinato de cálcio é indicado como antídoto dos efeitos tóxicos dos antagonistas do ácido fólico, tais como metotrexato, primetamina ou trimetoprima; para prevenir a toxicidade severa devido à superdose de metotrexato e como parte dos programas de tratamento quimioterápico no cuidado de várias formas de câncer. O folinato de cálcio também é indicado para o tratamento das anemias megaloblásticas por deficiência de folatos, quando a terapia oral não é adequada.

SULFATO FERROSO

Antianêmico que atua na reposição de ferro, auxiliando na prevenção e tratamento de anemias por deficiência de ferro.

Indicação: em anemias ferroprivas da gravidez e da lactação; anemias consequentes de hemorragias agudas .

7.4 ANTIASMÁTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	FENOTEROL 5 MG/ML, SOLUÇÃO, FRASCO GOTEJADOR	SAE - DST-AIDS	ANTIARRÍTMICOS
2	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO	SAE - DST-AIDS	ANTICOLINÉRGICOS

FENOTEROL, BROMIDRATO

É um broncodilatador que ao estimular os receptores beta adrenérgicos, no pulmão, fazem com que o músculo liso dos brônquios relaxem.

Indicação: em broncoespasmos associados a asma, tanto em crises agudas e brônquicas, quanto na prevenção de asma ocasionadas por atividades físicas. Também, trata e previne broncoespasmos causados por bronquite crônica, enfisema pulmonar e doença pulmonar obstrutiva crônica.

BROMETO DE IPRATRÓPIO

Sua ação ocorre no pulmão, na musculatura lisa dos brônquios ao antagonizar a acetilcolina e dilatar os brônquios.

Indicação: para tratar broncoespasmo relacionado a bronquite crônica, enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, além da asma, em ação conjunta com outros broncodilatadores.

7.5 ANTIBACTERIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	SAE - DST-AIDS	PENICILINAS
2	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	SAE - DST-AIDS	PENICILINAS
3	AMOXICILINA 50MG/ML (250MG/5ML), PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60ML, COM DOSADOR GRADUADO	SAE - DST-AIDS	PENICILINAS
4	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5G/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 75ML	SAE - DST-AIDS	PENICILINAS
5	AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG POR FRASCO), PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO	SAE - DST-AIDS	MACROLÍDEOS
6	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	SAE - DST-AIDS	MACROLÍDEOS
7	CEFALEXINA 500MG, COMPRIMIDO OU CÁPSULA EM BLISTER	SAE - DST-AIDS	CEFALOSPORINAS
8	CEFALEXINA 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 100ML	SAE - DST-AIDS	CEFALOSPORINAS
9	CIPROFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO.	SAE - DST-AIDS	QUINOLONAS
10	CLARITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	SAE - DST-AIDS	MACROLÍDEOS
11	DOXICICLINA 100 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	SAE - DST-AIDS	TETRACICLINAS
12	METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDO.	SAE - DST-AIDS	ANTIBACTERIANOS/ ANTIPROTOZOÁRIO
13	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G, POMADA, BISNAGA COM 10G.	SAE - DST-AIDS	ANTIBACTERIANOS DE USO USO TÓPICO
14	SULFADIAZINA 500MG	SAE - DST-AIDS	ANTIBACTERIANOS DE USO TÓPICO
15	SULFAMETAXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG, COMPRIMIDO	SAE - DST-AIDS	OUTROS ANTIBACTERIANOS
15	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETROPINA 8MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 50ML	SAE - DST-AIDS	OUTROS ANTIBACTERIANOS

AMOXICILINA

É uma penicilina usada como antibacteriano que atende uma grande variedade de espécies gram-positivas e gram-negativas.

Indicação: é utilizado na prevenção da endocardite bacteriana; tratamento da amigdalite; otite média; sinusite; gonorreia; infecção urinária, odontogênica, da pele e no trato respiratório baixo. Também é indicado nas infecções por *Chlamydia* em grávidas, na doença de Lyme, gastrite por *Helicobacter pylori*; úlcera péptica por *Helicobacter pylori*.

AMOXICILINA, ÁCIDO CLAVULÂNICO

Trata-se de uma penicilina que atende um grande variedade de espécies gram-positivas e gram-negativas. A amoxicilina também é encontrada em associação ao ácido clavulânico, que é produzido por meio da fermentação do *Streptomyces clavuligerus*, sendo um inibidor de betalactamases, melhorando a eficácia da amoxicilina.

Indicação: em infecções urinárias, odontogênicas, de pele, ainda para amigdalite, sinusite e vaginite.

AZITROMICINA, DI-HIDRATADA

Antibacteriano pertencente à família dos macrolídeos.

Indicação: em casos de infecção do trato respiratório inferior, bronquite e pneumonia; em casos de infecção do trato respiratório superior, sinusite e faringite/tonsilite. No tratamento de infecções genitais não complicadas devido a *Chlamydia trachomatis* e a *Neisseria gonorrhoeae* (ausência de resistência múltipla). Indicado no tratamento de cancro em *Haemophilus ducreyi*.

CEFALEXINA, MONOHIDRATADA

Faz parte dos betalactâmicos, sendo uma cefalosporina de primeira geração. Tem a capacidade de impedir a síntese da parede celular bacteriana, agindo em um amplo espectro contra Gram positiva e Gram negativa, além de ter rápida absorção.

Indicação: em infecções trato geniturinário; óssea; de pele e tecido mole; orofacial por anaeróbicos e por cocos Gram-positivos; pneumonia; otite média; faringite; amigdalite.

CLARITROMICINA

Trata-se de um antibacteriano, da família dos macrolídeos.

Indicação: na faringite; amigdalite; pneumonia; sinusite; na infecção orofacial causada por anaeróbicos ou por cocos Gram positivos; em infecções das vias aéreas superiores e inferiores,

além de infecções da pele e tecidos moles, ocasionados por microrganismos sensíveis à claritromicina. Também é indicada no tratamento de infecções provocadas por *Mycobacterium avium* ou *Mycobacterium intracellulare* (disseminadas ou localizadas) e *Mycobacterium chelonae*, *Mycobacterium fortuitum* ou *Mycobacterium kansasii* (localizadas).

CLORIDRATO DE DOXICICLINA

Antibacteriano, pertence ao grupo das tetraciclina.

Indicação: indicado para o tratamento de diversas infecções, ocasionadas por agentes sensíveis à doxiciclina. Tratamento da cólera, gengivite ulcerativa aguda com necrose (infecção de Vincent); periodontite (*Actinobacillus actinomycetemcomitans*); prevenção e tratamento da malária; tratamento da febre maculosa. Uso em casos que a penicilina é contra- indicada. Auxilia no tratamento da infecção aguda por amebas no intestino e no tratamento da acne.

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO

É um agente antibacteriano fluoroquinolônico sintético.

Indicação: tratamento de infecções complicadas e não complicadas ocasionadas por microrganismos sensíveis ao ciprofloxacino. - Infecções do trato genito-urinário. Trato respiratório: o cloridrato de ciprofloxacino Possível tratamento de escolha, no trato respiratório, em caso de pneumonias causadas por *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Proteus spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella catarrhalis*, *Legionella spp.* e *Staphylococcus*. Não deve ser considerado como primeira escolha em casos de pacientes ambulatoriais com pneumonia causada por *Pneumococcus*. Recomendado para tratamento da otite média e sinusite, principalmente se a infecção for causada por organismos gram-negativos, inclusive *Pseudomonas aeruginosa* ou *Staphylococcus*.

METRONIDAZOL

É um antimicrobiano e antiprotozoário. Possui boa atuação em várias doenças protozoárias e infecções bacterianas ao causar morte celular dessas, agindo sobre o DNA. Alcança sua absorção máxima entre 8 e 12 horas, com meia vida plasmática de aproximadamente 8 a 10 horas. O consumo de bebida alcoólica e metronidazol não é recomendado.

Indicação: em infecção oral causada por microrganismos anaeróbicos, tais como *Bacteroides*, *Clostridium spp* e alguns estreptococos; periodontite por *Actinobacillus actinomycetemcomitans*; tricomoníase; vaginite por *Gardnerella vaginalis*.

NEOMICINA + BACITRACINA

O sulfato de neomicina + bacitracina zínica é um medicamento formado pela associação de dois antibióticos de uso local, sem administração por via sistêmica.

Indicação: tratamento de infecções bacterianas da pele e de mucosas, causadas por microorganismos sensíveis: piodermites, impetigo, eczemas infectados, otite externa, infecções da mucosa nasal, furúnculos, antraz, ectima, abscessos, acne infectada, intertrigo, úlceras cutâneas e queimaduras infectadas. Na profilaxia de infecções cutâneo-mucosas provenientes de ferimentos cortantes (inclusive cirúrgicos), abrasões, queimaduras pouco extensas, dentre outros.

SULFADIAZINA:

Atua por ação bacteriostática. É eficiente no tratamento das infecções gonocócicas, estafilocócicas, estreptocócicas e meningocócicas.

SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA

Indicação: em casos de infecção gênito-urinária, renal, respiratória, bronquite crônica, na otite média, em alguns casos de pneumonia. Além de uso na toxoplasmose.

7. 6 ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	BROMOPRIDA 10 MG, COMPRIMIDO	SAE - DST-AIDS	ANTIEMÉTICO
2	BROMOPRIDA 4MG/ML – SOLUÇÃO ORAL- FRASCO COM 20 ML	SAE - DST-AIDS	ANTIEMÉTICO

BROMOPRIDA

É um antiemético.

Indicação: distúrbios da motilidade gastrintestinal; refluxo gastroesofágico; náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de medicamentos).

7.7 ANTIFÚNGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	CETOCONAZOL 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO	SAE - DST-AIDS	ANTIFÚNGICO
2	CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA, DIPROPIONATO 0,5MG/G - CREME DERMATOLOGICO - BISNAGA COM 30G	SAE - DST-AIDS	ANTIFÚNGICO
3	CETOCONAZOL 200MG, COMPRIMIDOS	SAE - DST-AIDS	ANTIFÚNGICO
4	CLOTRIMAZOL 10 MG/G (1%), CREME VAGINAL, BISNAGA COM 35 G + APLICADOR	SAE - DST-AIDS	ANTIFÚNGICO
5	FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA.	SAE - DST-AIDS	ANTIFÚNGICO
6	ITRACONAZOL 100 MG, CÁPSULA.	SAE - DST-AIDS	ANTIFÚNGICO
7	MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80 G + APLICADOR.	SAE - DST-AIDS	ANTIFÚNGICO
8	NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML.	SAE - DST-AIDS	ANTIFÚNGICO
9	NISTATINA 25.000UI/G (OU 100.000UI/4G), CREME VAGINAL, BISNAGA COM 60G +	SAE - DST-AIDS	ANTIFÚNGICO
10	NISTATINA 100.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G - POMADA DERMATOLOGICA - BISNAGA COM 60G	SAE - DST-AIDS	ANTIFÚNGICO
11	SECNIDAZOL 1000MG, COMPRIMIDO	SAE - DST-AIDS	ANTIFÚNGICO

CETOCONAZOL

Indicação: tratamento de candidíase oral, vaginal, disseminada; dermatite seborréica; casos graves de - Tinea corporis; Tinea cruris; Tinea pedis (pé-de-atleta); Tinea versicolor (pitiríase versicolor).

CETOCONAZOL + BETAMETASONA

Este medicamento é destinado ao tratamento de micoses (doenças inflamatórias da pele) que foram afetadas ou possam ser afetadas por fungos ou leveduras.

CLOTRIMAZOL

Indicação: tratamento de dermatomicoses causadas por dermatófitos, leveduras, bolores, etc. (por ex.: *Tinea pedis*, *Tinea manuum*, *Tinea corporis*, *Tinea inguinalis*, *Pityriasis versicolor*). Tratamento de infecções dos genitais externos e áreas adjacentes na mulher, assim como inflamação da glândula e prepúcio do parceiro sexual causada por leveduras (vulvite e balanite por *Candida*).

FLUCONAZOL

Indicação: tratamento de candidíase oral, vaginal; casos de - *Tinea corporis*; *Tinea cruris*; *Tinea pedis* (pé-de-atleta).

ITRACONAZOL

Indicação: tratamento de candidíase oral, orofaríngea, vaginal; casos de - *Tinea corporis*; *Tinea cruris*; *Tinea pedis* (pé-de-atleta); *Tinea manuum*; *Tinea versicolor* (pitiríase versicolor).

MICONAZOL, NITRATO

Indicação: tratamento de candidíase oral, cutânea, vaginal; casos de - *Tinea corporis*; *Tinea cruris*; *Tinea pedis* (pé-de-atleta); *Tinea versicolor* (pitiríase versicolor).

NISTATINA

Indicação: tratamento de candidíase oral e vaginal.

SECNIDAZOL

Este medicamento é destinado ao tratamento de: - giardíase (doença causada pelo protozoário *Giardia lamblia*); - amebíase intestinal sob todas as formas (doença causada pela presença de amebas no intestino); - amebíase hepática (doença causada pela presença de amebas no fígado); - tricomoníase (doença sexualmente transmissível, causada pelo protozoário *Trichomonas vaginalis*).

7.8 ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G, CREME, BISNAGA 10 G.	SAE - DST-AIDS	CORTICOSTEROIDES
2	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 60ML+ MEDIDOR.	SAE - DST-AIDS	CORTICOSTEROIDES
3	PREDNISONA 5 MG, COMPRIMIDO.	SAE - DST-AIDS	CORTICOSTEROIDES
4	PREDNISONA 20 MG, COMPRIMIDO.	SAE - DST-AIDS	CORTICOSTEROIDES

DEXAMETASONA, ACETATO.

Indicação: utilizado como anti- inflamatório e imunossupressor, principalmente para tratamento intensivo, realizados em períodos mais curtos.

PREDNISOLONA

Indicação: tratamento de condições endócrinas, e como terapia de algumas neoplasias. Indicado como agente anti-inflamatório e imunossupressor em distúrbios com mecanismos fisiopatológicos que possuam processos inflamatórios e/ou autoimunes.

PREDNISONA

Indicação: tratamento de diversas doenças que geram inflamação grave-endócrinas, osteomusculares, reumáticas, do colágeno, dermatológicas, alérgicas, oftálmicas, respiratórias, hematológicas, neoplásicas.

7.9 ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS, FRASCO 30ML.	SAE - DST-AIDS	ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL
2	IBUPROFENO 600 MG, COMPRIMIDO.	SAE - DST-AIDS	ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL

IBUPROFENO

Indicação: tratamento da artrite reumatoide, osteoartrite, reumatismo articular, traumas no sistema musculoesquelético, amenizando os sinais e sintomas em decorrência de componentes inflamatórios e dolorosos que possam estar presentes. Alívio da dor após procedimentos cirúrgicos.

7.10 ANTIPARASITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL.	SAE - DST-AIDS	ANTI-PROTOZOÁRIOS
2	IVERMECTINA 6 MG, COMPRIMIDO.	SAE - DST-AIDS	ANTI-HELMÍNTICOS
3	MEBENDAZOL 100MG, COMPRIMIDO	SAE - DST-AIDS	ANTIPARASITÁRIO
4	MEBENDAZOL 20MG/ML, (100MG/5ML) SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML	SAE - DST-AIDS	ANTIPARASITÁRIO

ALBENDAZOL

Indicação: tratamento de infecções parasitárias ocasionadas por *Ascaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis*, *Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale*, *Trichuris trichiura*, *Strongyloides stercoralis*, *Taenia spp.* e *Hymenolepis nana*. Também é utilizado para a opistorquíase (*Opisthorchis viverrini*) e a larva migrans cutânea, além de giardíase (*Giardia lamblia*, *G. duodenalis*, *G. intestinalis*) infantil.

IVERMECTINA

Indicação: estrogiloidíase intestinal (infecção por *Strongyloides stercoralis*); oncocercose (infecção por *Onchocerca volvulus*); filariose (infecção por *Wuchereria bancrofti*); escabiose, sarna (infecção por *Sarcoptes scabiei*); pediculose (*Pediculus capitis*).

MEBENDAZOL

Indicação: uso como anti-helmíntico polivalente, com a finalidade de tratar infestações isoladas ou mistas, causadas por *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Enterobius vermicularis*, *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*, *Taenia solium* e *Taenia saginata*.

7.11 ANTISSECRETORES

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULA.	SAE - DST-AIDS	ANTISSECRETORES

OMEPRAZOL

Indicação: úlceras pépticas benignas, gástricas ou duodenais. Em casos de hiperacidez gástrica, prevenindo que úlceras gástricas ou duodenais reapareçam na síndrome de Zollinger-Ellison. Faz parte do esquema para supressão do *Helicobacter pylori*, protege a mucosa gástrica contra prejuízos possíveis de serem ocasionados por anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e também protege na esofagite de refluxo, em crianças com mais de um ano de idade.

7.12 ANTIVIRAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	ACICLOVIR 200MG, COMPRIMIDO	SAE - DST-AIDS	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA
2	ACICLOVIR 50MG/G – POMADA – BISNAGA 10 G	SAE – DST-AIDS	ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

ACICLOVIR

Indicação: tratamento de infecções causadas por *Herpes simplex* na pele e mucosas, incluindo herpes genital recente e de repetição. Em imunocompetentes, indica-se para suprimir casos recorrentes e em imunocomprometidos como medida profilática. Para o tratamento de infecções pelo *Herpes zoster*.

7.13 SUBSTÂNCIAS MINERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FÓRMULA DA OMS), PÓ, ENVELOPE 27,9 G.	SAE – DST-AIDS	SUPLEMENTOS MINERAIS

SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL

Indicação: prevenção da desidratação e manutenção da hidratação após a fase de reidratação em quadros de doença diarreica aguda.

7.14 VITAMINAS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO	GRUPO FARMACOLÓGICO
1	POLIVITAMÍNICO SOLUÇÃO ORAL, CONTENDO NO MÍNIMO VIT. A + VIT. B1+ VIT. B2 + VIT. B5 + VIT. B6 + VIT. B8 + VIT. C+ VIT. D+ VIT. E, FRASCO COM 20ML	SAE – DST-AIDS	SUPLEMENTOS MINERAIS
2	POLIVITAMÍNICO, CONTENDO NO MÍNIMO: VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B6 + VITAMINA B12 + NICOTINAMIDA + VITAMINA B5 + ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) + VITAMINA E + ZINCO	SAE – DST-AIDS	SUPLEMENTOS MINERAIS

POLIVITAMÍNICO

Indicação: para suprir os estados de deficiência de diversos elementos, algumas vezes associados ao estresse oxidativo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa.gov.br. Disponível em: <<https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/>>. Acesso em: março. 2023.

NORIVAL, C. BPR Guia de Remédios 2016/17. 13.ed. Porto Alegre: Artmed, 2016

RANG, H.P. et al. Rang e Dale Farmacologia. 8ª.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016

https://io.convertiez.com.br/m/drogal/uploads/bulas/7898505093138/levonorgestrel__etinilestradiol.pdf

<https://static-webv8.jet.com.br/drogaosuper/Bulas/7891045000895.pdf>

[DEMEDROX® \(acetato de medroxiprogesterona\)](#)

<https://www.saudedireta.com.br/catinc/drugs/bulas/rovamicina.pdf>

https://guiadafarmaciadigital.com.br/arquivos-uploads/bula/bula_022900_1.pdf

https://cdn.eurofarma.com.br/wp-content/uploads/2016/09/Bula_Nimesulida_Profissional-1.pdf

<https://www.saudedireta.com.br/catinc/drugs/bulas/icaden.pdf>